

Innehållsförteckning - Barn

Publicerad 06.07.2024

7 - 15 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

1 - 6 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

3 - 12 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

0 - 3 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

7 - 15 år - Hudsymtom

1 - 6 år - Hudsymtom

3 - 12 mån - Hudsymtom

0 - 3 mån - Hudsymtom

7 - 15 år - Sår

1 - 6 år - Sår

3 - 12 mån - Sår

7 - 15 år - Tandsymtom, symtom i munregionen

1 - 6 år - Tandsymtom, symtom i munregionen

3 - 12 mån - Tandsymtom, symtom i munregionen

7 - 15 år - Andnöd, andningssvårighet

1 - 6 år - Andnöd, andningssvårighet

3 - 12 mån - Andnöd, andningssvårighet

0 - 3 mån - Andnöd, andningssvårighet

7 - 15 år - Ansiktsskada

1 - 6 år - Ansiktsskada

3 - 12 mån - Ansiktsskada

7 - 15 år - Öronsymtom

1 - 6 år - Öronsymtom

3 - 12 mån - Öronsymtom

0 - 3 mån - Öronsymtom

7 - 15 år - Feber

1 - 6 år - Feber

3 - 12 mån - Feber

0 - 3 mån - Feber

7 - 15 år - Förgiftning

1 - 6 år - Förgiftning

3 - 12 mån - Förgiftning

0 - 3 mån - Förgiftning

7 - 15 år - Svalgsymtom och halsont

1 - 6 år - Halsont

3 - 12 mån - Halsont

7 - 15 år - Kräkning

1 - 6 år - Kräkning

3 - 12 mån - Kräkning

0 - 3 mån - Kräkning

7 - 15 år - Knölar och bölder

1 - 6 år - Knölar och bölder

3 - 12 mån - Knölar och bölder

7 - 15 år - Köldskador, nedkylning

1 - 6 år - Köldskador, nedkylning

3 - 12 mån - Köldskador, nedkylning

7 - 15 år - Brännskador

1 - 6 år - Brännskador

3 - 12 mån - Brännskador

7 - 15 år - Huvudtrauma

1 - 6 år - Huvudtrauma

3 - 12 mån - Huvudtrauma

7 - 15 år - Huvudvärk

1 - 6 år - Huvudvärk

3 - 12 mån - Huvudvärk

7 - 15 år - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

1 - 6 år - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

3 - 12 mån - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

0 - 3 mån - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

7 - 15 år - Skador i extremitet

1 - 6 år - Skador i extremitet

3 - 12 mån - Skador i extremitet

7 - 15 år - Bröstsmärta

1 - 6 år - Bröstsmärta

3 - 12 mån - Bröstsmärta

0 - 3 mån - Bröstsmärta

7 - 15 år - Blodig avföring

1 - 6 år - Blodig avföring

3 - 12 mån - Blodig avföring

7 - 15 år - Främmande kropp

1 - 6 år - Främmande kropp

3 - 12 mån - Främmande kropp

7 - 15 år - Urineringsproblem

1 - 6 år - Urineringsproblem

3 - 12 mån - Urineringsproblem

7 - 15 år - Hosta

1 - 6 år - Hosta

3 - 12 mån - Hosta

0 - 3 mån - Hosta

7 - 15 år - Buksmärta, förstoppning

1 - 6 år - Buksmärta, förstoppning

3 - 12 mån - Buksmärta, förstoppning

7 - 15 år - Avvikande blodsockervariation

1 - 6 år - Avvikande blodsockervariation

3 - 12 mån - Avvikande blodsockervariation

7 - 15 år - Ögonsymtom, synstörning

1 - 6 år - Ögonsymtom, synstörning

3 - 12 mån - Ögonsymtom, synstörning

7 - 15 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

1 - 6 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

3 - 12 mån - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

7 - 15 år - Diarrè

1 - 6 år - Diarrè

3 - 12 mån - Diarrè

7 - 15 år - Bröstmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet

1 - 6 år - Bröstmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet

3 - 12 mån - Bröstmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet

7 - 15 år - Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)

1 - 6 år - Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)

7 - 15 år - Näsblödning

1 - 6 år - Näsblödning

3 - 12 mån - Näsblödning

7 - 15 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

1 - 6 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

3 - 12 mån - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

7 - 15 år - Insektsstick, djurbett

1 - 6 år - Insektsstick, djurbett

3 - 12 mån - Insektsstick, djurbett

7 - 15 år - Yrsel, balanssvårighet

1 - 6 år - Yrsel, balanssvårighet

3 - 12 mån - Yrsel, balanssvårighet

7 - 15 år - Hudfärg

1 - 6 år - Hudfärg

3 - 12 mån - Hudfärg

7 - 15 år - Smärta eller symtom i könsorganen

1 - 6 år - Smärta eller symtom i könsorganen

3 - 12 mån - Smärta eller symtom i könsorganen

0 - 3 mån - Smärta eller symtom i könsorganen

7 - 15 år - Krockpatient eller patient som fallit

1 - 6 år - Krockpatient eller patient som fallit

3 - 12 mån - Krockpatient eller patient som fallit

7 - 15 år - coronavirussmitta

1 - 6 år - coronavirussmitta

3 - 12 mån - coronavirussmitta

0 - 3 mån - coronavirussmitta

7 - 15 år - Misstanke om diabetes

1 - 6 år - Misstanke om diabetes

3 - 12 mån - Misstanke om diabetes

0 - 3 mån - Misstanke om diabetes

7 - 15 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Tidpunkt för exponeringen?
- ▶ Tidpunkten för när symtomen började?

Symtom och deras framskridande:

Utslag? Omfattning?

- ▶ Andningssvårighet? Högljudd andning?

Svullnad?

Kräkning?

Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

- ▶ Kända allergier?
- ▶ Läkemedel som används?
- ▶ Allergiläkemedel som tagits (antihistamin, adrenalin)?
- ▶ Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Bröstmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Förgiftning
- ▶ Hosta
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Insektsstick, djurbett
- ▶ Kräkning
- ▶ Svalgsymtom och halsont
- ▶ Yrsel, balanssvårighet
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation - 112

- ▶ Svår tidigare anafylaktisk reaktion
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Högljudd andning
- ▶ Svullnad: Läppar, tunga, ansikte
- ▶ Slappt, blekt, sjukt barn
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen
- ▶ Allergimedicinering lindrar inte symtomen (eksem, klåda)
- ▶ Kräkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Misstanke om 1:a allergiska reaktionen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts
- ▶ Allergimedicinering hjälper inte mot vattensnuva, nästäppa, klåda i ögonen)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Antihistamin mot klåda
- ▶ Mild kortisonsalva mot lokala irritationssymtom på huden

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS

Ytterligare information

- ▶ [Hälsobyn.fi: Astma och allergi](https://halsobyn.fi)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Tidpunkt för exponeringen?
- ▶ Tidpunkten för när symtomen började?

Symtom och deras framskridande:

Utslag? Omfattning?

- ▶ Andningssvårighet? Högljudd andning?

Svullnad?

Kräkning?

Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

- ▶ Kända allergier?
- ▶ Läkemedel som används?
- ▶ Allergiläkemedel som tagits (antihistamin, adrenalin)?
- ▶ Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Bröstmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Förgiftning
- ▶ Halsont
- ▶ Hosta
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Insektsstick, djurbett
- ▶ Kräkning
- ▶ Yrsel, balanssvårighet
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation - 112

- ▶ Svår tidigare anafylaktisk reaktion
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Högljudd andning
- ▶ Svullnad: Läppar, tunga, ansikte
- ▶ Slappt, blekt, sjukt barn
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen
- ▶ Allergimedicinering lindrar inte symtomen (eksem, klåda)
- ▶ Kräkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Misstanke om 1:a allergiska reaktionen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts
- ▶ Allergimedicinering hjälper inte mot vattensnuva, nästäppa, klåda i ögonen)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS

Ytterligare information

- ▶ [Hälsobyn.fi: Astma och allergi](https://halsobyn.fi)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Tidpunkt för exponeringen?
- ▶ Tidpunkten för när symtomen började?

Symtom och deras framskridande:

Utslag? Omfattning?

- ▶ Andningssvårighet? Högljudd andning?
- ▶ Svullnad?
- ▶ Kräkning?
- ▶ Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

- ▶ Kända allergier?
- ▶ Läkemedel som används?
- ▶ Allergiläkemedel som tagits (antihistamin, adrenalin)?
- ▶ Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Bröstmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Förgiftning
- ▶ Halsont
- ▶ Hosta
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Insektsstick, djurbett
- ▶ Kräkning
- ▶ Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Svår tidigare anafylaktisk reaktion
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Högljudd andning
- ▶ Svullnad: Läppar, tunga, ansikte
- ▶ Slappt, blekt, sjukt barn
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen
- ▶ Kräkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Misstanke om 1:a allergiska reaktionen, om symtomen fortsätter

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS

Ytterligare information

- ▶ [Hälsobyn.fi](https://halsobyn.fi): Astma och allergi

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Tidpunkt för exponeringen?
- ▶ Tidpunkten för när symtomen började?

Symtom och deras framskridande:

Utslag? Omfattning?

- ▶ Andningssvårighet? Högljudd andning?
Svullnad?
Kräkning?
Barnets tillstånd (slappt, blekt)?

- ▶ Kända allergier?
- ▶ Läkemedel som används?
- ▶ Tidigare allergiska/anafylaktiska reaktioner?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Svår tidigare anafylaktisk reaktion
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Högljudd andning
- ▶ Svullnad: Läppar, tunga, ansikte
- ▶ Slappt, blekt, sjukt barn
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Kraftigt och omfattande utslag på nästan hela kroppen
- ▶ Kräkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Misstanke om 1:a allergiska reaktionen, om symtomen fortsätter

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Har ofta haft samma lindriga symtom, har inte undersökts

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A92 - Allergi eller allergisk reaktion UNS

Ytterligare information

- ▶ [Hälsobyn.fi: Astma och allergi](https://halsobyn.fi/)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Hudsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Allmäntillstånd: Kan barnet väckas? Slumrar barnet till? Får man kontakt med barnet?
Smärta? Orkar barnet röra på sig? Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Eksemets omfattning?
- ▶ Klåda?
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier)?
- ▶ Blåsor?
- Andra symtom?
- ▶ Feber?
- Förkylningssymtom?
- ▶ Barnets tillstånd (slappt, trött, blekt)?
- ▶ När började eksemet?
- ▶ Känd hudsjukdom? Motsvarande tidigare?
- ▶ Misstanke om mässling? Har barnet vaccinerats?
- ▶ Blåmärken: Hur mycket och var?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Insektstick, djurbett

Nödsituation – 112

- ▶ Anafylaktiska symtom (se: Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)
- ▶ Trött, slapt, blekt barn
- ▶ Svullnad: läppar, tunga, ansikte?
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier) och feber /utredning 112
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Klåda på huden eller outhärdlig smärta, kan inte sova
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Omfattande stora blåsor
- ▶ Genomgående jämn röd hud och feber
- ▶ Misstanke om mässling (luftvägsinfektion och eksem, känd kontakt eller utlandsresa)
- ▶ Mycket blåmärken och/eller på avvikande ställen
- ▶ Lokal rodnad, hetta, (svullnad) + feber

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Lokal rodnad, hetta, (svullnad) (Misstanke om insektsstick, se: Insektsstick, djurbett)

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om impetigo och klarar sig hemma med symtomen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvarigt eksem
- ▶ Upprepade eksemsymtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin (allergimedisin) och recept
- ▶ Lindriga hudreaktioner: uppföljning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S01 - Smärta / ömhet i huden
- ▶ S02 - Klåda
- ▶ S03 - Vårtor
- ▶ S04 - Svullnad/knöl, lokal
- ▶ S05 - Svullnad/knölar, generaliserad
- ▶ S06 - Utslag, lokalt
- ▶ S07 - Utslag, generaliserat
- ▶ S08 - Förändring av hudfärgen, annan
- ▶ S09 - Infektion i finger/ tå
- ▶ S10 - Böld
- ▶ S11 - Hudinfektion efter trauma
- ▶ S12 - Insektbett/-stick
- ▶ S13 - Bett av djur/mänska
- ▶ S15 - Främmande kropp i huden

Ytterligare information

- ▶ [God medicinsk praxis: Hudinfektioner](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Hudsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Allmäntillstånd: Kan barnet väckas? Slumrar barnet till? Får man kontakt med barnet?
Smärta? Orkar barnet röra på sig? Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Eksemets omfattning?
- ▶ Klåda?
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier)?
- ▶ Blåsor?
- Andra symtom?
- ▶ Feber?
- Förkylningssymtom?
- ▶ Barnets tillstånd (slappt, trött, blekt)?
- ▶ När började eksemet?
- ▶ Känd hudsjukdom? Motsvarande tidigare?
- ▶ Misstanke om mässling? Har barnet vaccinerats?
- ▶ Blåmärken: Hur mycket och var?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Insektstick, djurbett

Nödsituation - 112

- ▶ Anafylaktiska symtom (Se Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)
- ▶ Trött, slapt, blekt barn
- ▶ Svullnad: Läppar, tunga, ansikte
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier) och feber
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Klåda på huden eller outhärdlig smärta, kan inte sova
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Omfattande stora blåsor
- ▶ Genomgående jämn röd hud och feber
- ▶ Misstanke om mässling (luftvägsinfektion och eksem, känd kontakt eller utlandsresa)
- ▶ Mycket blåmärken och/eller på avvikande ställen
- ▶ Lokal rodnad, hetta, (svullnad) + feber

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Misstanke om impetigo och klarar sig hemma med symtomen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om impetigo och klarar sig hemma med symtomen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvarigt eksem
- ▶ Upprepade eksemsymtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin (allergimedicin) och recept
- ▶ Lindriga hudreaktioner: uppföljning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S01 - Smärta / ömhet i huden
- ▶ S02 - Klåda
- ▶ S03 - Vårtor
- ▶ S04 - Svullnad/knöl, lokal
- ▶ S05 - Svullnad/knölar, generaliserad
- ▶ S06 - Utslag, lokalt
- ▶ S07 - Utslag, generaliserat
- ▶ S08 - Förändring av hudfärgen, annan
- ▶ S09 - Infektion i finger/ tå
- ▶ S10 - Böld
- ▶ S11 - Hudinfektion efter trauma
- ▶ S12 - Insektbett/-stick
- ▶ S13 - Bett av djur/mänska
- ▶ S15 - Främmande kropp i huden

Ytterligare information

- ▶ [God medicinsk praxis: Hudinfektioner](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Hudsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Allmäntillstånd: Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt? Kan barnet väckas? Slumrar barnet till? Får man kontakt med barnet?
- ▶ Eksemets omfattning?
- ▶ Klåda?
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier)?
- ▶ Blåsor?
- Andra symtom?
 - ▶ Feber
 - Förkylningssymtom
- ▶ När började eksemet
- ▶ Känd hudsjukdom? Motsvarande tidigare?
- ▶ Misstanke om mässling?
- ▶ Blåmärken: Hur mycket och var?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Insektstick, djurbett

Nödsituation - 112

- ▶ Anafylaktiska symtom (se Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)
- ▶ Trött, slapt, blekt barn
- ▶ Svullnad: Läppar, tunga, ansikte
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier) och feber
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Klåda på huden eller outhärdlig smärta, kan inte sova
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Omfattande stora blåsor
- ▶ Genomgående jämn röd hud och feber
- ▶ Misstanke om mässling (luftvägsinfektion och eksem, känd kontakt eller utlandsresa)
- ▶ Mycket blåmärken och/eller på avvikande ställen
- ▶ Lokal rodnad, hetta, (svullnad) + feber

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Lokal rodnad, hetta, (svullnad) (Misstanke om insektsstick, se: Insektsstick, djurbett)

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om impetigo och klarar sig hemma med symtomen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvarigt eksem
- ▶ Upprepade eksemsymtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin (allergimedicin) och recept
- ▶ Lindriga hudreaktioner: uppföljning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S01 - Smärta / ömhet i huden
- ▶ S02 - Klåda
- ▶ S03 - Vårtor
- ▶ S04 - Svullnad/knöl, lokal
- ▶ S05 - Svullnad/knölar, generaliserad
- ▶ S06 - Utslag, lokalt
- ▶ S07 - Utslag, generaliserat
- ▶ S08 - Förändring av hudfärgen, annan
- ▶ S09 - Infektion i finger/ tå
- ▶ S10 - Böld
- ▶ S11 - Hudinfektion efter trauma
- ▶ S12 - Insektbett/-stick
- ▶ S13 - Bett av djur/mänska
- ▶ S15 - Främmande kropp i huden

Ytterligare information

- ▶ [God medicinsk praxis: Hudinfektioner](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Hudsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- Allmäntillstånd: Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling),
▶ gråtmilt, irriterat, slappt? Kan barnet väckas? Slumrar barnet till? Får man kontakt med barnet?
- ▶ Eksemets omfattning?
- ▶ Klåda?
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier)?
- ▶ Blåsor?
- Andra symtom?
- ▶ Feber
Förkylningssymtom
- ▶ När började eksemet
- ▶ Känd hudsjukdom? Motsvarande tidigare?
- ▶ Misstanke om mässling?
- ▶ Blåmärken: Hur mycket och var?
- ▶ Orkar barnet äta?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Anafylaktiska symtom (se Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)
- ▶ Trött, slapt, blekt barn
- ▶ Svullnad: Läppar, tunga, ansikte?
- ▶ Blodutgjutningar / mörka, punktformiga hudförändringar (petekier) och feber
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Feber
- ▶ Klåda på huden eller outhärdlig smärta, kan inte sova
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Blåsor, även enstaka
- ▶ Genomgående jämn röd hud och feber
- ▶ Misstanke om mässling (luftvägsinfektion och eksem, känd kontakt eller utlandsresa)
- ▶ Mycket blåmärken och/eller på avvikande ställen
- ▶ Lokal rodnad, hetta, (svullnad) + feber

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Lokal rodnad, hetta, (svullnad) (misstanke om insektsstick, se: Insektsstick, djurbett)

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om impetigo och klarar sig hemma med symtomen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvarigt eksem
- ▶ Upprepade eksemsymtom

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S01 - Smärta / ömhet i huden
- ▶ S02 - Klåda
- ▶ S03 - Vårtor
- ▶ S04 - Svullnad/knöl, lokal
- ▶ S05 - Svullnad/knölar, generaliserad
- ▶ S06 - Utslag, lokalt
- ▶ S07 - Utslag, generaliserat
- ▶ S08 - Förändring av hudfärgen, annan
- ▶ S09 - Infektion i finger/ tå
- ▶ S10 - Böld
- ▶ S11 - Hudinfektion efter trauma
- ▶ S12 - Insektbett/-stick
- ▶ S13 - Bett av djur/mänska
- ▶ S15 - Främmande kropp i huden

Ytterligare information

- ▶ [God medicinsk praxis: Hudinfektioner](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Sår

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Var och hur stort och djupt?
- ▶ Blöder det ännu/mycket?
- ▶ När har såret uppkommit?
- ▶ Brister i funktionen eller känselbortfall vid t.ex. sår på handen/armen.

Se också

- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Brännskador
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)
- ▶ Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel
- ▶ Skador i extremitet

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Sår som blöder rikligt trots försök att få blödningen att upphöra

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Sår i genitalområdet
- ▶ Färskt sår som ska sutureras/limmas
- ▶ Inflammerat sår och allmän påverkan
- ▶ Operationssår som blöder/utsöndrar sekret eller är inflammerat

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Operationssår som gått upp
- ▶ Gammalt sår: djupt, misstanke om senskada, i ansiktet.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Avlägsning av suturer

Rådgivning / hemvård

- ▶ Hudskador och skrubbsår och sår som inte sys/limmas: anvisningar för lokalbehandling
- ▶ Anvisningar för att få blödning att upphöra
- ▶ Gamla sår: ytliga: anvisningar för lokalbehandling

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa
- ▶ S18 - Laceration / skärsår
- ▶ S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Sår hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Sår

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Var och hur stort och djupt?
- ▶ Blöder det ännu/mycket?
- ▶ När har såret uppkommit?
- ▶ Brister i funktionen eller känselbortfall vid t.ex. sår på handen/armen.

Se också

- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Brännskador
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)
- ▶ Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel
- ▶ Skador i extremitet

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Sår som blöder rikligt trots försök att få blödningen att upphöra

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Sår i genitalområdet
- ▶ Färskt sår som ska sutureras/limmas
- ▶ Inflammerat sår och allmän påverkan
- ▶ Operationssår som blöder/utsöndrar sekret eller är inflammerat

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Operationssår som gått upp
- ▶ Gammalt sår: djupt, misstanke om senskada, i ansiktet.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Avlägsning av suturer

Rådgivning / hemvård

- ▶ Hudskador och skrubbsår och sår som inte sys/limmas: anvisningar för lokalbehandling
- ▶ Anvisningar för att få blödning att upphöra
- ▶ Gamla sår: ytliga: anvisningar för lokalbehandling

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa
- ▶ S18 - Laceration / skärsår
- ▶ S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Sår hos barn \(FI\)](#).

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Sår

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Var och hur stort och djupt?
- ▶ Blöder det ännu/mycket?
- ▶ När har såret uppkommit?
- ▶ Brister i funktionen eller känselbortfall vid t.ex. sår på handen/armen.

Se också

- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Brännskador
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel
- ▶ Skador i extremitet

Nödsituation – 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Sår som blöder rikligt trots försök att få blödningen att upphöra

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Sår i genitalområdet
- ▶ Färskt sår som ska sutureras/limmas
- ▶ Inflammerat sår och allmän påverkan
- ▶ Operationssår som blöder/utsöndrar sekret eller är inflammerat

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Operationssår som gått upp
- ▶ Gammalt sår: djupt, misstanke om senskada, i ansiktet.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Avlägsning av suturer

Rådgivning / hemvård

- ▶ Hudskador och skrubbsår och sår som inte sys/limmas: anvisningar för lokalbehandling
- ▶ Anvisningar för att få blödning att upphöra
- ▶ Gamla sår: ytliga: anvisningar för lokalbehandling

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa
- ▶ S18 - Laceration / skärsår
- ▶ S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Sår hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Tandsymtom, symtom i munregionen

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt?
- ▶ Symtom i en permanent tand eller mjölktdand?
- ▶ Kan patienten bita ihop tänderna? Är bittet smärtsamt?
- ▶ Är bittet smärtsamt?
- ▶ En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltlösning
- ▶ En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter en timme)

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Svalgsymtom och halsont
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Okontrollerbar blödning i munnen

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Tandtrauma och patienten kan inte bita ihop tänderna eller det är smärtsamt
- ▶ Permanent tand har lossnat

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Tand har blivit intryckt
- ▶ Tandvärk utan trauma

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Tandköttsinflammation

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ kandidos
- ▶ Blåsor på munnens slemhinna (patienten mår bra)
- ▶ slemhinneförändringar

Rådgivning / hemvård

- ▶ Mjölktänder fästs inte på nytt

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D19 - Symptom / besvär beträffande tänder / tandkött
- ▶ D20 - Symptom / besvär beträffande mun / tunga / läppar

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Afte och små sår i munnen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Blåsor och sår i munnen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Muninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande spottkörtelinflammationer hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Tandsymtom, symtom i munregionen

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt?
- ▶ Symtom i en permanent tand eller mjölktdand?
- ▶ Kan patienten bita ihop tänderna? Är bittet smärtsamt?
- ▶ Är bittet smärtsamt?
- ▶ En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltlösning
- ▶ En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter en timme)

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Halsont
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Okontrollerbar blödning i munnen

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Tandtrauma och patienten kan inte bita ihop tänderna eller det är smärtsamt
- ▶ Permanent tand har lossnat

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Tand har blivit intryckt
- ▶ Tandvärk utan trauma

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Tandköttsinflammation

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ kandidos
- ▶ Blåsor på munnens slemhinna (patienten mår bra)
- ▶ slemhinneförändringar

Rådgivning / hemvård

- ▶ Mjölktänder fästs inte på nytt

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D19 - Symptom / besvär beträffande tänder / tandkött
- ▶ D20 - Symptom / besvär beträffande mun / tunga / läppar

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Afte och små sår i munnen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Blåsor och sår i munnen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Muninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande spottkörtelinflammationer hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Tandsymtom, symtom i munregionen

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt?
- ▶ Symtom i en permanent tand eller mjölktdand?
- ▶ Kan patienten bita ihop tänderna? Är bittet smärtsamt?
- ▶ Är bittet smärtsamt?
- ▶ En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltlösning
- ▶ En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter en timme)

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Halsont
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Okontrollerbar blödning i munnen

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Tandtrauma och patienten kan inte bita ihop tänderna eller det är smärtsamt

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Tand har blivit intryckt
- ▶ Tandköttsinflammation
- ▶ Tandvärk utan trauma

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Blåsor på munnens slemhinna (patienten mår bra)
- ▶ slemhinneförändringar

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ kandidos

Rådgivning / hemvård

- ▶ Mjölktänder fästs inte på nytt

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D19 - Symptom / besvär beträffande tänder / tandkött
- ▶ D20 - Symptom / besvär beträffande mun / tunga / läppar

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Afte och små sår i munnen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Blåsor och sår i munnen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Muninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande spottkörtelinflammationer hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Andnöd, andningssvårighet

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
 - ▶ Slumrar barnet till?
 - ▶ Får man kontakt med barnet?
 - ▶ Smärta?
 - ▶ Orkar barnet röra på sig?
 - ▶ Är barnet exceptionellt trött?
 - ▶ Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt avvikande?
 - ▶ När och hur har andningssvårigheten börjat?
 - ▶ Använder patienten astmamedicinering? Om patienten har astmamedicinering, har den använts/effektiverats?
 - ▶ Grundsjukdomar: t.ex. astma eller annan lungsjukdom, hjärtfel, diabetes?
 - ▶ Feber eller andra symtom?
 - ▶ Skada på bröstkorgen inom några veckor?
 - ▶ Eventuell främmande kropp?
 - ▶ Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom)
 - ▶ Orkar barnet dricka?
 - ▶ Orkar barnet prata (meningar)?
 - ▶ Orkar barnet sitta? Gå?
- Risk för lungemboli:
- ▶ Tonårsflickor: Användning av preventivmedel?
Lång immobilisering?
 - ▶ Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?
 - ▶ Astmamedicin?
 - ▶ Skällande hosta?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Hosta

Nödsituation – 112

- ▶ Trött/svår att väcka, slapt, blekt barn
- ▶ Cyanos (ansiktsblåhet)
- ▶ Orkar inte prata
- ▶ Orkar inte sitta / gå
- ▶ Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)
- ▶ Svullnad i ansiktet
- ▶ Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll
- ▶ Misstanke om främmande kropp
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Andningen är pumpande, stönande, ytlig
- ▶ Orkar inte dricka
- ▶ Astmamedicinering, om effektiverad medicinering inte hjälper
- ▶ Skällande hosta med andningssvårighet som inte lindras vid kyla (se anvisningar för hemvård)
- ▶ Primärsjukdom: t.ex. hjärtfel, lungsjukdom, diabetes
- ▶ Risk för lungemboli: tonårsflickor (användning av preventivmedel) eller lång immobilisering

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Andningssvårigheten upprepas trots maximal astmamedicinering

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ För astmatiker medicinintag med maximal dos (även om patienten är på väg till mottagningen)
- ▶ Skällande hosta (struphuvudsinflammation): kall luft som första hjälp. Om det inte ger effekt eller symtomet återkommer styrs patienten till jouren.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R04 - Andningsproblem, annan
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R80 - Influensa
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Astma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningsuppehåll \(apné\) i barndomen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Kikhosta \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hosta hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Andnöd, andningssvårighet

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt avvikande?
- ▶ När och hur har andningssvårigheten börjat?
- ▶ Använder patienten astmamedicinering? Om patienten har astmamedicinering, har den använts/effektiverats?
- ▶ Grundsjukdomar: t.ex. astma eller annan lungsjukdom, hjärtfel, diabetes?
- ▶ Feber eller andra symtom?
- ▶ Skada på bröstkorgen inom några veckor?
- ▶ Eventuell främmande kropp?
- ▶ Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom)
- ▶ Orkar barnet dricka?
- ▶ Orkar barnet prata (meningar)?
- ▶ Orkar barnet sitta? Gå?
- ▶ Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?
- ▶ Skällande hosta?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Hosta

Nödsituation – 112

- ▶ Trött/svår att väcka, slapt, blekt barn
- ▶ Cyanos (ansiktsblåhet)
- ▶ Orkar inte prata
- ▶ Orkar inte sitta/gå
- ▶ Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom)
- ▶ Svullnad i ansiktet
- ▶ Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll
- ▶ Misstanke om främmande kropp
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Andningen är pumpande, stönande, ytlig
- ▶ Orkar inte dricka
- ▶ Astmamedicinering, om effektiverad medicinering inte hjälper
- ▶ Skällande hosta med andningssvårighet som inte lindras vid kyla
- ▶ Primärsjukdom: t.ex. hjärtfel, lungsjukdom, diabetes

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Andningssvårigheten upprepas trots maximal astmamedicinering

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R04 - Andningsproblem, annan
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R80 - Influensa
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Astma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningsuppehåll \(apné\) i barndomen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Kikhosta \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hosta hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Andnöd, andningssvårighet

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slapt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt avvikande?
- ▶ När och hur har andningssvårigheten börjat?
- ▶ Använder patienten astmamedicinering? Om patienten har astmamedicinering, har den använts/effektiverats?
- ▶ Grundsjukdomar: t.ex. astma eller annan lungsjukdom, hjärtfel, diabetes?
- ▶ Feber eller andra symtom?
- ▶ Skada på bröstkorgen inom några veckor?
- ▶ Eventuell främmande kropp?
- ▶ Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom)
- ▶ Orkar barnet äta eller dricka?
- ▶ Har barnet ljud/jollrar hen?
- ▶ Orkar barnet röra sig?
- ▶ Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?
- ▶ Skällande hosta?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp
- ▶ Hosta

Nödsituation - 112

- ▶ Trött/svår att väcka, slapt, blekt barn
- ▶ Cyanos (ansiktsblåhet)
- ▶ Har inga ljud/jollrar
- ▶ Orkar inte röra sig
- ▶ Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom)
- ▶ Svullnad i ansiktet
- ▶ Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll
- ▶ Misstanke om främmande kropp
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Andningen är pumpande, stönande, ytlig
- ▶ Äter/dricker dåligt
- ▶ Astmamedicinering, om effektiverad medicinering inte hjälper
- ▶ Skällande hosta med andningssvårighet som inte lindras vid kyla
- ▶ Primärsjukdom: t.ex. hjärtfel, lungsjukdom, diabetes

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Andningssvårigheten upprepas trots maximal astmamedicinering

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R04 - Andningsproblem, annan
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R80 - Influensa
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Astma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningsuppehåll \(apné\) i barndomen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Kikhosta \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hosta hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Andnöd, andningssvårighet

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Hurdan är andningen: Stönande, pumpande, flåsande, tät, pipande eller på annat sätt avvikande?
- ▶ Har barnet andningsuppehåll?
- ▶ När och hur har andningssvårigheten börjat?
- ▶ Har barnet konstaterats ha sjukdomar, såsom hjärtfel eller annan strukturell avvikelse (särskilt i luftvägarna)?
- ▶ Feber eller andra symtom?
- ▶ Eventuellt en främmande kropp?
- ▶ Är det fråga om en eventuell allergisk reaktion/anafylaxi? (Se Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom)
- ▶ Orkar barnet äta?
- ▶ Har barnet ljud/jollrar hen?
- ▶ Orkar barnet röra sig?
- ▶ Är barnet snuvigt/täppt?
- ▶ Tidigare andningssvårigheter? Krävt sjukhusvård?

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Trött/svår att väcka, slapt, blekt barn
- ▶ Cyanos (ansiktsblåhet)
- ▶ Har inga ljud/jollrar
- ▶ Orkar inte röra sig
- ▶ Misstanke om anafylaxi (Se: Allergisk reaktion, anafylaktiskt symtom)
- ▶ Svullnad i ansiktet
- ▶ Föräldern meddelar att barnet har andningsuppehåll
- ▶ Misstanke om främmande kropp
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Alltid när man misstänker andnöd och kriterierna i punkt Nödsituation - 112 inte uppfylls

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R04 - Andningsproblem, annan
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R80 - Influensa
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr med förträngning/infektionsastma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Astma hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningssvårighet hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Andningsuppehåll \(apné\) i barndomen \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Kikhosta \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Lunginflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Luftrörskatarr hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Mykoplasma och ureaplasma som sjukdomsalstrare \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hosta hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Ansiktsskada

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt?
- ▶ Skadeenergi?
- ▶ Synliga skador?
- ▶ Kan patienten öppna munnen?
- ▶ Skada i ögonregionen: Ögonens rörelser, syn

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Näsblödning
- ▶ Sår
- ▶ Tandsymtom, symtom i munregionen
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

- ▶ Svåra ansiktsskador
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ sår i ansiktet
- ▶ misstanke om fraktur
- ▶ Ögonens rörelser eller synproblem
- ▶ kan inte öppna munnen ordentligt
- ▶ högenergisk skada
- ▶ Tandtrauma och patienten klarar inte av att bita eller det är smärtsamt
- ▶ permanent tand har lossnat

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Tand har blivit intryckt

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ytliga skråmor i ansiktet: hemvårdsanvisningar
- ▶ Bula i pannan, mår bra: kyla
- ▶ Mjölktänder fästs inte på nytt
- ▶ En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltlösning
- ▶ En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter en timme)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga
- ▶ F76 - Främmande kropp i öga
- ▶ F85 - Hornhinneulceration
- ▶ H78 - Ytlig öronskada
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ S16 - Kontusion
- ▶ S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa
- ▶ S18 - Laceration / skärsår
- ▶ S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Ansiktsskada

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt?
- ▶ Skadeenergi?
- ▶ Synliga skador?
- ▶ Kan patienten öppna munnen?
- ▶ Skada i ögonregionen: Ögonens rörelser, syn

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Näsblödning
- ▶ Sår
- ▶ Tandsymtom, symtom i munregionen
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation - 112

- ▶ Svåra ansiktsskador
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ sår i ansiktet
- ▶ misstanke om fraktur
- ▶ Ögonens rörelser eller synproblem
- ▶ kan inte öppna munnen ordentligt
- ▶ högenergisk skada
- ▶ Tandtrauma och patienten klarar inte av att bita eller det är smärtsamt
- ▶ permanent tand har lossnat

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Tand har blivit intryckt

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ytliga skråmor i ansiktet: hemvårdsanvisningar
- ▶ Bula i pannan, mår bra: kyla
- ▶ Mjölktänder fästs inte på nytt
- ▶ En tand som lossnat förvaras i patientens saliv eller mjök eller i fysiologisk koksaltlösning
- ▶ En tand som lossnat ska i regel fästas på nytt inom 2 timmar (prognosen försämras efter en timme)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga
- ▶ F76 - Främmande kropp i öga
- ▶ F85 - Hornhinneulceration
- ▶ H78 - Ytlig öronskada
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ S16 - Kontusion
- ▶ S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa
- ▶ S18 - Laceration / skärsår
- ▶ S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Ansiktsskada

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt?
- ▶ Skadeenergi?
- ▶ Synliga skador?
- ▶ Kan patienten öppna munnen?
- ▶ Skada i ögonregionen: Ögonens rörelser, syn

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Näsblödning
- ▶ Sår
- ▶ Tandsymtom, symtom i munregionen
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation – 112

- ▶ Svåra ansiktsskador
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ sår i ansiktet
- ▶ misstanke om fraktur
- ▶ Ögonens rörelser eller synproblem
- ▶ kan inte öppna munnen ordentligt
- ▶ högenergisk skada
- ▶ Tandtrauma och patienten klarar inte av att bita eller det är smärtsamt

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Tand har blivit intryckt

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ytliga skråmor i ansiktet: hemvårdsanvisningar
- ▶ Bula i pannan, mår bra: kyla
- ▶ Mjölktänder fästs inte på nytt

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga
- ▶ F76 - Främmande kropp i öga
- ▶ F85 - Hornhinneulceration
- ▶ H78 - Ytlig öronskada
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ S16 - Kontusion
- ▶ S17 - Hudavskrapning / skråma/blåsa
- ▶ S18 - Laceration / skärsår
- ▶ S19 - Hudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Öronsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Var har barnet ont (inne i örat, ytterörat runt örat)?
- ▶ Hurdan är smärtan?
- ▶ När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?
- ▶ Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om?
- ▶ Andra symtom (feber, förkylning)?
- ▶ Har barnet fått smärtstillande medicin? Hjälpte det?
- ▶ Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Öronvärk där smärtstillande medicin inte hjälper
- ▶ Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat
- ▶ Sår som söndrar huden eller brosket i örat
- ▶ Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen
- ▶ Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Akut hörsselförlust
- ▶ Trumhinneperforation orsakad av tryck
- ▶ Akut bullerskada eller akustiskt trauma

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om främmande kropp i örat
- ▶ Sekret utsöndras från örat, allmäntillståndet bra
- ▶ Tuböra som läcker, allmäntillståndet bra
- ▶ akut hörselnedsättning utan andra symtom
- ▶ Besvär efter öronoperation som utförts under den senaste månaden: kontakt till enheten som utfört operationen

Tidsbokning utan brådskan (4-7 dygn)

- ▶ Örontäppa
- ▶ Tinnitus eller sus i örat, har börjat akut
- ▶ Långvarig öronvärk
- ▶ Tidvis öronvärk

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anvisningar för smärtmedicinering, vårdas hemma om smärtmedicinen hjälper

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H02 - Hörselbesvär
- ▶ H04 - Sekretion från öra
- ▶ H27 - Rädsla för öronsjukdom
- ▶ H70 - Örongångsinflammation / extern otit
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ H76 - Främmande kropp i öra

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(God medicinsk praxis-rekommendation\) \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Öronsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Var har barnet ont (inne i örat, ytterörat runt örat)?
- ▶ När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?
- ▶ Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om?
- ▶ Andra symtom(feber, förkylning)?
- ▶ Har barnet fått smärtstillande medicin? Hjälpte det?
- ▶ Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Öronvärk där smärtstillande medicin (> 6 mån.) inte hjälper
- ▶ Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat
- ▶ Sår som söndrar huden eller brosket i örat
- ▶ Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen
- ▶ Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Akut hörsselförlust
- ▶ Trumhinneperforation orsakad av tryck
- ▶ Akut bullerskada eller akustiskt trauma

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om främmande kropp i örat
- ▶ Sekret utsöndras från örat, allmäntillståndet bra
- ▶ Tuböra som läcker, allmäntillståndet bra
- ▶ Akut hörselnedsättning utan andra symtom
- ▶ Besvär efter öronoperation som utförts under den senaste månaden: kontakt till enheten som utfört operationen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Örontäppa
- ▶ Tinnitus eller sus i örat, har börjat akut
- ▶ Långvarig öronvärk
- ▶ Tidvis öronvärk

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anvisningar för smärtmedicinering, vårdas hemma om smärtmedicinen hjälper

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H02 - Hörselbesvär
- ▶ H04 - Sekretion från öra
- ▶ H27 - Rädsla för öronsjukdom
- ▶ H70 - Örongångsinflammation / extern otit
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ H76 - Främmande kropp i öra

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(God medicinsk praxis-rekommendation\) \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Öronsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Varför misstänker föräldern öronvärk hos babyn?
- ▶ När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?
- ▶ Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om?
- ▶ Andra symtom (feber, förkylning)?
- ▶ Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Öronvärk där smärtstillande medicin (> 6 mån.) inte hjälper
- ▶ Gråtande baby (< 6 mån.) som inte lugnar sig
- ▶ Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat
- ▶ Sår som söndrar huden eller brosket i örat
- ▶ Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen
- ▶ Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatusens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om främmande kropp i örat
- ▶ Sekret utsöndras från örat, allmäntillståndet bra
- ▶ Tuböra som läcker, allmäntillståndet bra
- ▶ akut hörselnedsättning utan andra symtom
- ▶ Besvär efter öronoperation som utförts under den senaste månaden: kontakt till enheten som utfört operationen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anvisningar för smärtmedicinering, vårdas hemma om smärtmedicinen hjälper

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H02 - Hörselbesvär
- ▶ H04 - Sekretion från öra
- ▶ H27 - Rädsla för öronsjukdom
- ▶ H70 - Örongångsinflammation / extern otit
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ H76 - Främmande kropp i öra

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(God medicinsk praxis-rekommendation\) \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Öronsymtom

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? - Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Varför misstänker föräldern öronvärk hos babyn?
- ▶ När har smärtan börjat? Och hur har den utvecklats?
- ▶ Har barnet haft motsvarande tidigare? Om ja, vad handlade det då om?
- ▶ Andra symtom (feber, förkylning)?
- ▶ Rodnad på ytterörat, bakom/runt örat?

Se också

- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Feber
- ▶ Gråtande baby (< 6 mån.) som inte lugnar sig
- ▶ Svullnad i ytterörat, utstående öra, kraftigt utvidgad rodnad bakom/runt örat
- ▶ Sår som söndrar huden eller brosket i örat
- ▶ Skarpt avgränsat eksem med blåsor i öronregionen
- ▶ Knappbatteri i hörselgången. Obs! Hörapparatusens öronstycke har inte batteri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Misstanke om främmande kropp i örat

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Gråtmildhet/rastlöshet lugnar sig, uppföljning hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H02 - Hörselbesvär
- ▶ H04 - Sekretion från öra
- ▶ H27 - Rädsla för öronsjukdom
- ▶ H70 - Örongångsinflammation / extern otit
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ H76 - Främmande kropp i öra

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öroninflammation hos barn \(God medicinsk praxis-rekommendation\) \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande och långvarig öroninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Öronskador, skador i ytterörat, hörselgången och trumhinnan \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Hörselstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Feber

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Feber innebär över 38°C kroppstemperatur
- ▶ Hur länge har febern varat?
- ▶ Blir barnet piggare med febernedsättande läkemedel? Orkar barnet leka när hen är feberfri?
- ▶ Andra symtom (buksmärta, huvudvärk, annan lokal smärta, hudsymtom)?
- ▶ Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller annan sjukdom som påverkar immunförsvaret
- ▶ Har barnet genomgått en operation inom en vecka?
- ▶ Har barnet fått vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Stelhet i nacken?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Blodutgjutningar?
- ▶ Har barnet kissat?
- ▶ Orkar barnet dricka?

Se också

- ▶ Diarré
- ▶ Hosta
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Svalgsymtom och halsont
- ▶ Urineringsproblem
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Smärta
- ▶ Stelhet i nacken
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Krampanfall

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Barnet blir inte piggare med febernedsättande läkemedel
- ▶ Om buksmärtan eller huvudvärken inte lindras med smärtstillande läkemedel
- ▶ Symtom på urinvägsinfektion
- ▶ Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller annan sjukdom som påverkar immunförsvaret
- ▶ Barnet har genomgått en operation inom en vecka
- ▶ Röd hud (septisk chock)
- ▶ Vägrar gå
- ▶ Krampanfall som gått över
- ▶ Smärtsam, verkar sjuk

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Feber över 7 dygn, har inte besökt läkare, allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Haft feber 4-7 dygn och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvarig feber (över 7 dygn)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Återkommande kräkningar och diarré, allmänna måendet bra
- ▶ Feber under 3 dygn, bra allmäntillstånd: febernedsättande medicin och uppföljning
- ▶ Bihåleinflammation ovanligt hos barn under 12 år

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A02 - Frossbrytningar
- ▶ A03 - Feber
- ▶ A05 - Sjukdomskänsla
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A16 - Retlighet hos spädbarn
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ N07 - Kramper / krampanfall
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R72 - Streptokockfaryngit
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Influensa hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Feber

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Feber innebär över 38°C kroppstemperatur
- ▶ När steg febern?
- ▶ Har barnet fått febernedsättande läkemedel? Vilket läkemedel har barnet fått? Hur mycket? När?
- ▶ Blir barnet piggare med febernedsättande läkemedel? Orkar barnet leka när hen är feberfri?
- ▶ Andra symtom (buksmärta, huvudvärk, annan lokal smärta, hudsymtom)?
- ▶ Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller annan sjukdom som påverkar immunförsvaret
- ▶ Har barnet genomgått en operation inom en vecka?
- ▶ Har barnet får vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Stelhet i nacken?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Blodutgjutningar?
- ▶ Har barnet kissat?
- ▶ Orkar barnet dricka?

Se också

- ▶ Diarré
- ▶ Halsont
- ▶ Hosta
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Urineringsproblem
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Smärta
- ▶ Stelhet i nacken
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Krampanfall

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Barnet blir inte piggare med febernedsättande läkemedel
- ▶ Om buksmärtan eller huvudvärken inte lindras med smärtstillande läkemedel
- ▶ Symtom på urinvägsinfektion
- ▶ Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller annan sjukdom som påverkar immunförsvaret
- ▶ Barnet genomgått en operation inom en vecka
- ▶ Röd hud (septisk chock)
- ▶ Vägrar krypa/gå
- ▶ Krampanfall som gått över
- ▶ Smärtsam, verkar sjuk

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Feber över 7 dygn, har inte besökt läkare, allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Haft feber 4-7 dygn och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvarig feber (över 7 dygn)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Återkommande kräkningar och diarré, allmänna måendet bra
- ▶ Feber under 3 dygn, bra allmäntillstånd: febernedsättande medicin och uppföljning
- ▶ Bihåleinflammation ovanligt hos barn under 12 år

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A02 - Frossbrytningar
- ▶ A03 - Feber
- ▶ A05 - Sjukdomskänsla
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A16 - Retlighet hos spädbarn
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ N07 - Kramper / krampanfall
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R72 - Streptokockfaryngit
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Influensa hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Feber

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Feber innebär över 38°C kroppstemperatur
- ▶ När steg febern?
- ▶ Har barnet fått febernedsättande läkemedel? Vilket läkemedel har barnet fått? Hur mycket? När?
- ▶ Blir barnet piggare med febernedsättande läkemedel? Orkar barnet leka när hen är feberfri?
- ▶ Andra symtom (buksmärta, huvudvärk, annan lokal smärta, hudsymtom)?
- ▶ Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller annan sjukdom som påverkar immunförsvaret
- ▶ Har barnet genomgått en operation inom en vecka?
- ▶ Har barnet får vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet?
- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Blodutgjutningar?
- ▶ Har barnet kissat?
- ▶ Orkar barnet äta eller dricka?

Se också

- ▶ Diarrè
- ▶ Halsont
- ▶ Hosta
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Urineringsproblem
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Krampanfall

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Barnet blir inte piggare med febernedsättande läkemedel
- ▶ Om buksmärtan eller huvudvärken inte lindras med smärtstillande läkemedel
- ▶ Grundsjukdomar: cancer, organtransplantation, immunsuppressiv medicinering eller annan sjukdom som påverkar immunförsvaret
- ▶ Har barnet genomgått en operation inom en vecka
- ▶ Röd hud (septisk chock)
- ▶ Vägrar krypa/gå
- ▶ Krampanfall som gått över
- ▶ Smärtsam, verkar sjuk

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Återkommande kräkningar och diarré, allmänna måendet bra och vätsketillförsel lyckas
- ▶ Feber över 7 dygn, har inte besökt läkare, allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Haft feber 4-7 dygn och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvarig feber (över 7 dygn)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Feber under 3 dygn, bra allmäntillstånd: febernedsättande
- ▶ Bihåleinflammation ovanligt hos barn under 12 år

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A02 - Frossbrytningar
- ▶ A03 - Feber
- ▶ A05 - Sjukdomskänsla
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A16 - Retlighet hos spädbarn
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ N07 - Kramper / krampanfall
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R72 - Streptokockfaryngit
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Influensa hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Feber

Publicerad: 18.12.2023

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Feber innebär över 38°C kroppstemperatur
- ▶ När steg febern?
- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Blodutgjutningar?

Se också

- ▶ Kräkning
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka
- ▶ Blodutgjutningar
- ▶ Krampanfall

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Barn under 3 mån. med feber hänvisas alltid och omedelbart till vård

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A02 - Frossbrytningar
- ▶ A03 - Feber
- ▶ A05 - Sjukdomskänsla
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A16 - Retlighet hos spädbarn
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ H01 - Öronvärk
- ▶ H71 - Akut mellanöreinflammation / trumhinneinflammation
- ▶ N07 - Kramper / krampanfall
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R72 - Streptokockfaryngit
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R77 - Akut laryngit/trakeit
- ▶ R81 - Lunginflammation/pneumoni

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande infektioner hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Långvarig feber hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Influensa hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Förgiftning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?
- ▶ Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?
- ▶ Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex. rusmedelsanvändning)?
- ▶ Har patienten druckit alkohol eller tagit narkotika eller nikotin?
- ▶ Har ämnet tagits oavsiktligt eller avsiktligt? Är patienten självdestruktiv?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Brännskador
- ▶ Diarré
- ▶ Tandsymtom, symtom i munregionen

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Kramper
- ▶ Aggressivitet

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet (t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver

- ▶ information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Vid alla misstankar om förgiftning som inte är nödsituationer ska du ringa Giftinformationscentralen tfn 0800 147111
- ▶ Ämnet har tagits i självdestruktiva syften
- ▶ Berusad tonåring som slocknar, kan inte äta/dricka eller betar sig avvikande
- ▶ Yngre än tonåring som är berusad

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- En berusad tonåring som är vaken, svarar på frågor och kan äta/dricka. Det måste finnas
- ▶ en vuxen på plats som kan följa den ungas tillstånd. Gör en barnskyddsanmälan enligt de lokala anvisningarna.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A84 - Läkemedelsförgiftning
- ▶ A85 - Läkemedelsbiverkan
- ▶ A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Kolosförgiftning.\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det \(FI\)](#)
- ▶ [Giftinformationscentralen](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Förgiftning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?
- ▶ Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?
- ▶ Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex. rusmedelsanvändning)?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Brännskador
- ▶ Diarré
- ▶ Tandsymtom, symtom i munregionen

Nödsituation - 112

- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Kramper
- ▶ Aggressivitet

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet (t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver

- ▶ information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A84 - Läkemedelsförgiftning
- ▶ A85 - Läkemedelsbiverkan
- ▶ A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Kolosförgiftning.\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det \(FI\)](#)
- ▶ [Giftinformationscentralen](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Förgiftning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?
- ▶ Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?
- ▶ Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex. rusmedelsanvändning)?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Brännskador
- ▶ Diarré
- ▶ Tandsymtom, symtom i munregionen

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Kramper

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet (t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver

- ▶ information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Vid alla misstankar om förgiftning som inte är nödsituationer ska du ringa Giftinformationscentralen tfn 0800 147111

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A84 - Läkemedelsförgiftning
- ▶ A85 - Läkemedelsbiverkan
- ▶ A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Kolosförgiftning.\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det \(FI\)](#)
- ▶ [Giftinformationscentralen](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Förgiftning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Vad misstänks ha orsakat förgiftningen?
- ▶ Förekommer symtom? Hurdana symtom? Hur har symtomen utvecklats?
- ▶ Observera och ta reda på om de vuxna som är på plats kan ta hand om barnet (t.ex. rusmedelsanvändning)?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Kramper

Om du får intrycket att det inte finns någon vuxen på plats som kan ta hand om barnet (t.ex. på grund av rusmedel) ska du meddela nödcentralen. Nödcentralen behöver

- ▶ information om barnets vistelseort (adress) och telefonnummer, varifrån man ringt. Gör också en barnskyddsanmälan.

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Vid alla misstankar om förgiftning som inte är nödsituationer ska du ringa Giftinformationscentralen tfn 0800 147111

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt Giftinformationscentralens anvisningar.

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A84 - Läkemedelsförgiftning
- ▶ A85 - Läkemedelsbiverkan
- ▶ A86 - Giftverkan av annan substans

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Kolosförgiftning.\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Förgiftningsmisstanke hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Matförgiftning och diarré till följd av det \(FI\)](#)
- ▶ [Giftinformationscentralen](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Svalgsymtom och halsont

Publicerad: 26.01.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Har patienten feber eller annan allmän påverkan?
- ▶ Kan barnet äta och dricka normalt?
- ▶ Är andningen normal?
- ▶ Primärsjukdomar?
- ▶ Medicinering?
- ▶ Vaccinationer?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Tydlig andnöd eller andningssvårighet
- ▶ Dreglande
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ svår sväljningssvårighet eller låst käke
- ▶ svullnad som syns utanpå eller rodnad i ansiktet/halsregionen
- ▶ halsont och nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ halsont och bra allmäntillstånd

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtbehandling. Medicinens effekt bedöms 2 timmar efter att den intagits.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A75 - Körtelfeber / mononukleos
- ▶ A77 - Virussjukdom, annan eller ospecificerad
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R05 - Hosta
- ▶ R72 - Streptokockfaryngit
- ▶ R76 - Tonsillit akut

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Halsböld \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Inflammation i svalget hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Halsfluss \("angina"\) \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Halsont

Publicerad: 26.01.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Har patienten feber eller annan allmän påverkan?
- ▶ Kan barnet äta och dricka normalt?
- ▶ Är andningen normal?
- ▶ Primärsjukdomar?
- ▶ Medicinering?
- ▶ Vaccinationer?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Tydlig andnöd eller andningssvårighet
- ▶ Dreglande
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ svår sväljningssvårighet eller låst käke
- ▶ svullnad som syns utanpå eller rodnad i ansiktet/halsregionen
- ▶ halsont och nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ halsont och bra allmäntillstånd

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtbehandling. Medicinens effekt bedöms 2 timmar efter att den intagits.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A75 - Körtelfeber / mononukleos
- ▶ A77 - Virussjukdom, annan eller ospecificerad
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R05 - Hosta
- ▶ R72 - Streptokockfaryngit
- ▶ R76 - Tonsillit akut

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Halsböld \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Inflammation i svalget hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Halsfluss \("angina"\) \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Halsont

Publicerad: 26.01.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Har patienten feber eller annan allmän påverkan?
- ▶ Kan barnet äta och dricka normalt?
- ▶ Är andningen normal?
- ▶ Primärsjukdomar?
- ▶ Medicinering?
- ▶ Vaccinationer?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Tydlig andnöd eller andningssvårighet
- ▶ Dreglande
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ svår sväljningssvårighet eller låst käke
- ▶ svullnad som syns utanpå eller rodnad i ansiktet/halsregionen
- ▶ halsont och nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ halsont och bra allmäntillstånd

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtbehandling. Medicinens effekt bedöms 2 timmar efter att den intagits.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A75 - Körtelfeber / mononukleos
- ▶ A77 - Virussjukdom, annan eller ospecificerad
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R05 - Hosta
- ▶ R72 - Streptokockfaryngit
- ▶ R76 - Tonsillit akut

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Halsböld \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Inflammation i svalget hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Halsfluss \("angina"\) \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Kräkning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Hur länge har barnet kräkts?
- ▶ Hur mycket har barnet kräkts?
- ▶ Är kräkningen blodig eller helt grön?
- ▶ Varierar kräkningarna under dygnet?
- ▶ Har barnet druckit något? Hur mycket har barnet druckit?
- ▶ Har barnet feber?
- ▶ Har barnet andra symtom t.ex. diarré?
- ▶ Har barnet varit utomlands?
- ▶ Orkar barnet stå upp eller prata?
- ▶ Har någon i närmaste kretsen motsvarande?
- ▶ Huvudskada de närmaste dagarna?
- ▶ Är barnet piggt?
- ▶ Har barnet kissat?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Huvudvärk

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd, barnet orkar inte vara i kontakt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Blodkräkning
- ▶ Diabetes och upprepade kräkningar
- ▶ Kräkning och svår primärsjukdom (t.ex. metabol sjukdom)
- ▶ Shuntpatient och kräkning
- ▶ Kräkning och kraftig buksmärta som inte lättar
- ▶ Barnet kräks upprepade gånger och får inte behålla vätska
- ▶ Kräkningen är grön
- ▶ Kräkningar och huvudskada
- ▶ Kräkningar och huvudvärk som värkmedicin inte hjälper mot

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på magsjuka)
- ▶ Riklig kräkning, inga andra symtom, vätsketillförsel hemma lyckas inte

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Barnet/ungdomen är pigg och vätsketillförseln hemma lyckas

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D01 - Buksmärta / magkramp, allmän
- ▶ D02 - Magsmärta / värk i epigastriet
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D14 - Hematemes / blodkräkning
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N76 - Tumör UNS i nervsystemet
- ▶ N89 - Migrän
- ▶ T11 - Dehydrering
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Kräkning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Hur länge har barnet kräkts?
- ▶ Hur mycket har barnet kräkts?
- ▶ Är kräkningen blodig eller helt grön?
- ▶ Varierar kräkningarna under dygnet?
- ▶ Har barnet druckit något? Hur mycket har barnet druckit?
- ▶ Har barnet feber?
- ▶ Har barnet andra symtom t.ex. diarré?
- ▶ Har barnet varit utomlands?
- ▶ Orkar barnet leka eller prata?
- ▶ Har någon i närmaste kretsen motsvarande?
- ▶ Huvudskada de närmaste dagarna?
- ▶ Är barnet piggt?
- ▶ Har barnet kissat?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Huvudvärk

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet är slapt, svagt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Blodkräkning
- ▶ Diabetes och upprepade kräkningar
- ▶ Kräkning och svår primärsjukdom (t.ex. metabol sjukdom)
- ▶ Shuntpatient och kräkning
- ▶ Kräkning och kraftig buksmärta som inte lättar
- ▶ Barnet kräks upprepade gånger och får inte behålla vätska
- ▶ Kräkningen är grön
- ▶ Kräkningar och huvudskada
- ▶ Kräkningar och huvudvärk

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på magsjuka)
- ▶ Riklig kräkning, inga andra symtom, vätsketillförsel hemma lyckas inte

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Barnet är piggt och vätsketillförseln hemma lyckas

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D01 - Buksmärta / magkramp, allmän
- ▶ D02 - Magsmärta / värk i epigastriet
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D14 - Hematemes / blodkräkning
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N76 - Tumör UNS i nervsystemet
- ▶ N89 - Migrän
- ▶ T11 - Dehydrering
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Kräkning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Hur länge har barnet kräkts?
- ▶ Hur mycket har barnet kräkts?
- ▶ Är kräkningen blodig eller helt grön?
- ▶ Varierar kräkningarna under dygnet?
- ▶ Har barnet druckit något? Hur mycket har barnet druckit?
- ▶ Har barnet feber?
- ▶ Är babyn slapp eller blek?
- ▶ Har någon i närmaste kretsen motsvarande?
- ▶ Huvudskada de närmaste dagarna?
- ▶ Är barnet piggt?
- ▶ Har barnet kissat?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Huvudvärk

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet är slapt, svagt, blekt
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Blodkräkning
- ▶ Diabetes och upprepade kräkningar
- ▶ Kräkning och svår primärsjukdom (t.ex. metabol sjukdom)
- ▶ Shuntpatient och kräkning
- ▶ Hög feber >39 C
- ▶ Barnet kräks upprepade gånger och får inte behålla vätska
- ▶ Kräkningen är grön
- ▶ Kräkningar och huvudskada

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på magsjuka)
- ▶ Riklig kräkning, inga andra symtom, vätsketillförsel hemma lyckas inte

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Barnet är piggt och vätsketillförseln hemma lyckas

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D01 - Buksmärta / magkramp, allmän
- ▶ D02 - Magsmärta / värk i epigastriet
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D14 - Hematemes / blodkräkning
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N76 - Tumör UNS i nervsystemet
- ▶ N89 - Migrän
- ▶ T11 - Dehydrering
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Kräkning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Hur länge har barnet kräkts?
- ▶ Hur mycket har barnet kräkts?
- ▶ Är kräkningen blodig eller helt grön?
- ▶ Varierar kräkningarna under dygnet?
- ▶ Har barnet druckit något?
- ▶ Har barnet feber?
- ▶ Är babyn slapp eller blek?
- ▶ Har någon i närmaste kretsen motsvarande?
- ▶ Huvudskada de närmaste dagarna?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

- ▶ Babyn är slapp, svag, blek
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Babyn kräks upprepade gånger
- ▶ Babyn är ovanligt gråtmild
- ▶ Feber >38°C
- ▶ Babyn kräks rikligt direkt efter att ha druckit mjölk
- ▶ Blodkräkningar (om enbart blodiga strimmor i kräkningen kan man vänta till morgonen)
- ▶ Kräkningen är grön
- ▶ Kräkningar och huvudskada

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Upprepade nattliga och morgonbetonade kräkningar över 2 dygn (inga andra symtom på magsjuka) Babyn kastar upp rikligt som nytt symtom

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D01 - Buksmärta / magkramp, allmän
- ▶ D02 - Magsmärta / värk i epigastriet
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D14 - Hematemes / blodkräkning
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N76 - Tumör UNS i nervsystemet
- ▶ N89 - Migrän
- ▶ T11 - Dehydrering
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Uppstötning och kräkning hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Knölar och bölder

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ När har den uppkommit?
- ▶ På vilket område på kroppen och hur stor?
- ▶ Feber?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ hettande, rodnande, smärtsam knöl i huvud- eller halsregionen, kan inte vända på huvudet, andningssvårighet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ andra symtomatiska bölder
- ▶ snabbt uppkommande, växande knölar på halsen och i nyckelbensgropen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ förstörade lymfkörtlar

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ små knölar och bölder med lindriga symtom och smärtfria knölar och bölder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ B02 - Lymfkörtel, förstoraad / smärtsam
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ S04 - Svullnad/knöl, lokal
- ▶ S05 - Svullnad/knölar, generaliserad
- ▶ S10 - Böld
- ▶ S77 - Malign hudtumör
- ▶ S78 - Lipom
- ▶ S79 - Annan benign hudtumör /ospecificerad

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Knölar och bölder

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ När har den uppkommit?
- ▶ På vilket område på kroppen och hur stor?
- ▶ Feber?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ hettande, rodnande, smärtsam knöl i huvud- eller halsregionen, kan inte vända på huvudet, andningssvårighet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ andra symtomatiska bölder
- ▶ snabbt uppkommande, växande knölar på halsen och i nyckelbensgropen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ förstörade lymfkörtlar

Tidsbokning utan brådskan (4-7 dygn)

- ▶ små knölar och bölder med lindriga symtom och smärtfria knölar och bölder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ B02 - Lymfkörtel, förstoraad / smärtsam
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ S04 - Svullnad/knöl, lokal
- ▶ S05 - Svullnad/knölar, generaliserad
- ▶ S10 - Böld
- ▶ S77 - Malign hudtumör
- ▶ S78 - Lipom
- ▶ S79 - Annan benign hudtumör /ospecificerad

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Knölar och bölder

Publicerad: 18.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ När har den uppkommit?
- ▶ På vilket område på kroppen och hur stor?
- ▶ Feber?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ hettande, rodnande, smärtsam knöl i huvud- eller halsregionen, kan inte vända på huvudet, andningssvårighet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ andra symtomatiska bölder
- ▶ snabbt uppkommande, växande knölar på halsen och i nyckelbensgropen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ förstörade lymfkörtlar

Tidsbokning utan brådskan (4-7 dygn)

- ▶ små knölar och bölder med lindriga symtom och smärtfria knölar och bölder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ B02 - Lymfkörtel, förstoraad / smärtsam
- ▶ D21 - Sväljningssvårigheter
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ S04 - Svullnad/knöl, lokal
- ▶ S05 - Svullnad/knölar, generaliserad
- ▶ S10 - Böld
- ▶ S77 - Malign hudtumör
- ▶ S78 - Lipom
- ▶ S79 - Annan benign hudtumör /ospecificerad

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Köldskador, nedkylning

Publicerad: 01.02.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Hur lång köldexponering?
- ▶ Förekommer känselbortfall?
- ▶ Förekommer färgändringar eller blåsor på huden?

Se också

- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ omfattande köldskada eller blåsor på huden
- ▶ känsel, värme och hudfärg är inte återställda efter en timme

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Det köldskadade stället värms med varmt vatten 30-60 min

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A88 - Skadeverkan av fysisk faktor

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Köldskador, nedkylning

Publicerad: 01.02.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Hur lång köldexponering?
- ▶ Förekommer känselbortfall?
- ▶ Förekommer färgändringar eller blåsor på huden?

Se också

- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ omfattande köldskada eller blåsor på huden
- ▶ känsel, värme och hudfärg är inte återställda efter en timme

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Det köldskadade stället värms med varmt vatten 30-60 min

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A88 - Skadeverkan av fysisk faktor

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Köldskador, nedkylning

Publicerad: 01.02.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Hur lång köldexponering?
- ▶ Förekommer känselbortfall?
- ▶ Förekommer färgändringar eller blåsor på huden?

Se också

- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ omfattande köldskada eller blåsor på huden
- ▶ känsel, värme och hudfärg är inte återställda efter en timme

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Det köldskadade stället värms med varmt vatten 30-60 min

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A88 - Skadeverkan av fysisk faktor

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Brännskador

Publicerad: 01.02.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och var?
- ▶ Vilka områden har bränts och deras omfattning? (inte enbart rodnad)
- ▶ Är smärtan under kontroll?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Brännskada över 5 % av kroppens yta
- ▶ Brännskador som omringar en kroppsdel
- ▶ Barn som varit med om en brand
- ▶ Brännskador i munnen eller ansiktsregionen
- ▶ Andningssvårighet

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ brännskada i ansiktet
- ▶ brännskada (området större än den egna handflatan)
- ▶ brännskador på handen/armen och fotbladet
- ▶ genitalområdet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Effektiv smärtmedicinering
- ▶ Små brännskador: hemvårdsanvisningar
- ▶ Nedkylning av brännskadeområdet i 20 min
- ▶ brännskada (området mindre än den egna handflatan)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S11 - Hudinfektion efter trauma
- ▶ S14 - Brännskada/skållning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Brännskador

Publicerad: 01.02.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och var?
- ▶ Vilka områden har bränts och deras omfattning? (inte enbart rodnad)
- ▶ Är smärtan under kontroll?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Brännskada över 5 % av kroppens yta
- ▶ Brännskador som omringar en kroppsdel
- ▶ Barn som varit med om en brand
- ▶ Brännskador i munnen eller ansiktsregionen
- ▶ Andningssvårighet

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ brännskada i ansiktet
- ▶ brännskada (området större än den egna handflatan)
- ▶ brännskador på handen/armen och fotbladet
- ▶ genitalområdet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Effektiv smärtmedicinering
- ▶ Små brännskador: hemvårdsanvisningar
- ▶ Nedkylning av brännskadeområdet i 20 min
- ▶ brännskada (området mindre än den egna handflatan)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S11 - Hudinfektion efter trauma
- ▶ S14 - Brännskada/skållning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Brännskador

Publicerad: 01.02.2024

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och var?
- ▶ Vilka områden har bränts och deras omfattning? (inte enbart rodnad)
- ▶ Är smärtan under kontroll?
- ▶ OBS! Alla brännskador hos barn

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Brännskada över 5 % av kroppens yta
- ▶ Brännskador som omringar en kroppsdel
- ▶ Barn som varit med om en brand
- ▶ Brännskador i munnen eller ansiktsregionen
- ▶ Andningssvårighet

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ brännskada i ansiktet
- ▶ brännskada (området större än den egna handflatan)
- ▶ brännskada (området mindre än den egna handflatan)
- ▶ brännskador på handen/armen och fotbladet
- ▶ genitalområdet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Effektiv smärtmedicinering
- ▶ Nedkylning av brännskadeområdet i 20 min

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S11 - Hudinfektion efter trauma
- ▶ S14 - Brännskada/skållning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Huvudtrauma

Publicerad: 12.04.2024

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ När, vad har hänt?
- ▶ Symtom? (medvetslöshetens varaktighet, minneslucka/varaktighet, kräkning)

Se också

- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kramp, anfall, frånvaro, svimning
- ▶ Kräkning
- ▶ Sår
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Medvetslös, varierande medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ högenergiskt trauma

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ slagit huvudet för några dygn sedan, fortsättningsvis huvudvärk eller känsla av illamående

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ några dygn sedan skadan, exceptionell trötthet men allmänna måendet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Symtomfri, välmående: hemvårdsanvisningar
- ▶ Anvisning om när uppsöka läkare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Huvudtrauma

Publicerad: 12.04.2024

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ När, vad har hänt?
- ▶ Symtom? (medvetslöshetens varaktighet, minneslucka/varaktighet, kräkning)

Se också

- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kramp, anfall, frånvaro, svimning
- ▶ Kräkning
- ▶ Sår
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Medvetslös, varierande medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ högenergiskt trauma

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ slagit huvudet för några dygn sedan, fortsättningsvis huvudvärk eller känsla av illamående

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ några dygn sedan skadan, exceptionell trötthet men allmänna måendet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Symtomfri, välmående: hemvårdsanvisningar
- ▶ Anvisning om när uppsöka läkare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Huvudtrauma

Publicerad: 12.04.2024

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ När, vad har hänt?
- ▶ Symtom? (medvetslöshetens varaktighet, minneslucka/varaktighet, kräkning)

Se också

- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kramp, anfall, frånvaro, svimning
- ▶ Kräkning
- ▶ Sår
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Medvetslös, varierande medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ högenergiskt trauma

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ slagit huvudet för några dygn sedan, fortsättningsvis huvudvärk eller känsla av illamående

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ några dygn sedan skadan, exceptionell trötthet men allmänna måendet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Symtomfri, välmående: hemvårdsanvisningar
- ▶ Anvisning om när uppsöka läkare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Huvudvärk

Publicerad: 08.02.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ När och hur har det börjat?
- ▶ Hur länge har det pågått?
- ▶ Har patienten haft motsvarande symtom tidigare?
- ▶ Andra symtom?
- ▶ Huvudskada?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Kräkning
- ▶ Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation - 112

- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Neurologiska bristsymtom
- ▶ Stelhet i nacken

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ huvudvärk och hög feber som inte reagerar på smärtmediciner
- ▶ medvetslöshet, även om den gått om
- ▶ illamående eller kräkning
- ▶ exceptionell trötthet
- ▶ shuntpatient, huvudvärk (eller gråtig under 1 år)
- ▶ neurologiskt symtom, t.ex. minnesförlust
- ▶ huvudvärk som börjat i samband med kraftansträngning
- ▶ huvudvärk, smärtmedicin hjälper inte

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ återkommande morgonhuvudvärk som väcker, inga andra symtom

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ fallit, inga synliga symtom/skador

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Konstaterad migrän: anfallsmedicin och uppföljning hemma
- ▶ Tillräcklig smärtmedicin (i första hand paracetamol)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A16 - Retlighet hos spädbarn
- ▶ F05 - Störning i synförmåga, annan
- ▶ F17 - Symptom / besvär av glasögon
- ▶ F95 - Skelning
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N18 - Förlamning / svaghet
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ N89 - Migrän
- ▶ N95 - Spänningshuvudvärk
- ▶ P75 - Somatiseringssyndrom
- ▶ R75 - Sinuit akut/kronisk
- ▶ Z29 - Socialt problem UNS

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Bihåle-/käkhåleinflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Huvudvärk hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Päänsärky ja migreeni lapsilla \(Huvudvärk och migrän hos barn \(God medicinsk praxis-rekommendation\) \(FI\)\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Huvudvärk

Publicerad: 08.02.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ När och hur har det börjat?
- ▶ Hur länge har det pågått?
- ▶ Har patienten haft motsvarande symtom tidigare?
- ▶ Andra symtom?
- ▶ Huvudskada?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Kräkning
- ▶ Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation - 112

- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Neurologiska bristsymtom
- ▶ Stelhet i nacken

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ huvudvärk och hög feber som inte reagerar på smärtmediciner
- ▶ medvetslöshet, även om den gått om
- ▶ illamående eller kräkning
- ▶ exceptionell trötthet
- ▶ shuntpatient, huvudvärk (eller gråtig under 1 år)
- ▶ neurologiskt symtom, t.ex. minnesförlust
- ▶ huvudvärk som börjat i samband med kraftansträngning
- ▶ huvudvärk, smärtmedicin hjälper inte

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ återkommande morgonhuvudvärk som väcker, inga andra symtom

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ fallit, inga synliga symtom/skador

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Konstaterad migrän: anfallsmedicin och uppföljning hemma
- ▶ Tillräcklig smärtmedicin (i första hand paracetamol)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A16 - Retlighet hos spädbarn
- ▶ F05 - Störning i synförmåga, annan
- ▶ F17 - Symptom / besvär av glasögon
- ▶ F95 - Skelning
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N18 - Förlamning / svaghet
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ N89 - Migrän
- ▶ N95 - Spänningshuvudvärk
- ▶ P75 - Somatiseringssyndrom
- ▶ R75 - Sinuit akut/kronisk
- ▶ Z29 - Socialt problem UNS

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Bihåle-/käkhåleinflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Huvudvärk hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Päänsärky ja migreeni lapsilla \(Huvudvärk och migrän hos barn \(God medicinsk praxis-rekommendation\) \(FI\)\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Huvudvärk

Publicerad: 08.02.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ När och hur har det börjat?
- ▶ Hur länge har det pågått?
- ▶ Har patienten haft motsvarande symtom tidigare?
- ▶ Andra symtom?
- ▶ Huvudskada?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Kräkning
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)
- ▶ Ögonsymtom, synstörning

Nödsituation - 112

- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Neurologiska bristsymtom
- ▶ Stelhet i nacken

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ shuntpatient, huvudvärk (eller gråtig under 1 år)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Konstaterad migrän: anfallsmedicin och uppföljning hemma
- ▶ Tillräcklig smärtmedicin (i första hand paracetamol)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A16 - Retlighet hos spädbarn
- ▶ F05 - Störning i synförmåga, annan
- ▶ F17 - Symptom / besvär av glasögon
- ▶ F95 - Skelning
- ▶ L01 - Symptom / besvär beträffande nacke
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N18 - Förlamning / svaghet
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ N89 - Migrän
- ▶ N95 - Spänningshuvudvärk
- ▶ P75 - Somatiseringssyndrom
- ▶ R75 - Sinuit akut/kronisk
- ▶ Z29 - Socialt problem UNS

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Bihäle-/käähäleinflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Huvudvärk hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Päänsärky ja migreeni lapsilla \(Huvudvärk och migrän hos barn \(God medicinsk praxis-rekommendation\)\) \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Publicerad: 03.05.2024

Version: 8

Grunder

Klargöra

- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Feber?
- ▶ Var exakt är symtomet i extremiteten?
- ▶ Förekommer svullnad, rodnad eller värmekänsla?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Smärta som börjat akut och kall, kraftlös, avdomnad extremitet
- ▶ svår smärta, lämplig medicin fungerar inte
- ▶ smärta i extremitet och hög feber

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ använder inte extremiteten eller haltar som nytt symptom
- ▶ tydliga inflammationssymtom (smärta, rodnad, värmekänsla) i extremiteten/leden

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ ledrörelsebegränsning utan feber och smärta

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Återkommande smärtor i armar och ben.

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enstaka extremitetssymtom utan andra symtom: Smärtmedicin och uppföljning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A01 - Smärta, allmän / flera platser
- ▶ A03 - Feber
- ▶ L08 - Symptom / besvär beträffande skuldra
- ▶ L09 - Symptom / besvär beträffande arm
- ▶ L10 - Symptom / besvär beträffande armbåge
- ▶ L11 - Symptom / besvär beträffande handlov
- ▶ L12 - Symptom / besvär beträffande hand & fingrar
- ▶ L13 - Symptom / besvär beträffande höft
- ▶ L14 - Symptom / besvär beträffande lår / vad
- ▶ L15 - Symptom / besvär beträffande knä
- ▶ L16 - Symptom / besvär beträffande vrist
- ▶ L17 - Symptom / besvär beträffande fot / tå
- ▶ L18 - Muskelsmärta
- ▶ L19 - Symptom / besvär beträffande flera muskler, ospecificerat
- ▶ L20 - Symptom / besvär beträffande flera leder, ospecificerat
- ▶ L28 - Funktionsbegränsning / handikapp i muskuloskeletala organ
- ▶ L29 - Symptom / besvär i muskler / leder, annat
- ▶ L70 - Infektion i muskuloskeletala organ
- ▶ N18 - Förlamning / svaghet
- ▶ S06 - Utslag, lokalt

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Höftbesvär hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Ledgångsreumatism hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Publicerad: 03.05.2024

Version: 8

Grunder

Klargöra

- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Feber?
- ▶ Var exakt är symtomet i extremiteten?
- ▶ Förekommer svullnad, rodnad eller värmekänsla?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Smärta som börjat akut och kall, kraftlös, avdomnad extremitet
- ▶ svår smärta, lämplig medicin fungerar inte
- ▶ smärta i extremitet och hög feber

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ använder inte extremiteten eller haltar som nytt symptom
- ▶ tydliga inflammationssymtom (smärta, rodnad, värmekänsla) i extremiteten/leden

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ ledrörelsebegränsning utan feber och smärta

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Återkommande smärtor i armar och ben.

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enstaka extremitetssymtom utan andra symtom: Smärtmedicin och uppföljning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A01 - Smärta, allmän / flera platser
- ▶ A03 - Feber
- ▶ L08 - Symptom / besvär beträffande skuldra
- ▶ L09 - Symptom / besvär beträffande arm
- ▶ L10 - Symptom / besvär beträffande armbåge
- ▶ L11 - Symptom / besvär beträffande handlov
- ▶ L12 - Symptom / besvär beträffande hand & fingrar
- ▶ L13 - Symptom / besvär beträffande höft
- ▶ L14 - Symptom / besvär beträffande lår / vad
- ▶ L15 - Symptom / besvär beträffande knä
- ▶ L16 - Symptom / besvär beträffande vrist
- ▶ L17 - Symptom / besvär beträffande fot / tå
- ▶ L18 - Muskelsmärta
- ▶ L19 - Symptom / besvär beträffande flera muskler, ospecificerat
- ▶ L20 - Symptom / besvär beträffande flera leder, ospecificerat
- ▶ L28 - Funktionsbegränsning / handikapp i muskuloskeletala organ
- ▶ L29 - Symptom / besvär i muskler / leder, annat
- ▶ L70 - Infektion i muskuloskeletala organ
- ▶ N18 - Förlamning / svaghet
- ▶ S06 - Utslag, lokalt

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Höftbesvär hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Ledgångsreumatism hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Publicerad: 03.05.2024

Version: 8

Grunder

Klargöra

- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Feber?
- ▶ Var exakt är symtomet i extremiteten?
- ▶ Förekommer svullnad, rodnad eller värmekänsla?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ -
- ▶ smärta i extremitet och hög feber
- ▶ -
- ▶ ensidig svullnad som börjat akut

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ does not use the limb or limbs as a new symptom
- ▶ tydliga inflammationssymtom (smärta, rodnad, värmekänsla) i extremiteten/leden
- ▶ ledrörelsebegränsning utan feber och smärta

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Återkommande smärtor i armar och ben.

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enstaka extremitetssymtom utan andra symtom: Smärtmedicin och uppföljning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A01 - Smärta, allmän / flera platser
- ▶ A03 - Feber
- ▶ L08 - Symptom / besvär beträffande skuldra
- ▶ L09 - Symptom / besvär beträffande arm
- ▶ L10 - Symptom / besvär beträffande armbåge
- ▶ L11 - Symptom / besvär beträffande handlov
- ▶ L12 - Symptom / besvär beträffande hand & fingrar
- ▶ L13 - Symptom / besvär beträffande höft
- ▶ L14 - Symptom / besvär beträffande lår / vad
- ▶ L15 - Symptom / besvär beträffande knä
- ▶ L16 - Symptom / besvär beträffande vrist
- ▶ L17 - Symptom / besvär beträffande fot / tå
- ▶ L18 - Muskelsmärta
- ▶ L19 - Symptom / besvär beträffande flera muskler, ospecificerat
- ▶ L20 - Symptom / besvär beträffande flera leder, ospecificerat
- ▶ L28 - Funktionsbegränsning / handikapp i muskuloskeletala organ
- ▶ L29 - Symptom / besvär i muskler / leder, annat
- ▶ L70 - Infektion i muskuloskeletala organ
- ▶ N18 - Förlamning / svaghet
- ▶ S06 - Utslag, lokalt

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Höftbesvär hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Ledgångsreumatism hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Publicerad: 03.05.2024

Version: 8

Grunder

Klargöra

- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Feber?
- ▶ Var exakt är symtomet i extremiteten?
- ▶ Förekommer svullnad, rodnad eller värmekänsla?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ -
- ▶ feber
- ▶ -
- ▶ ensidig svullnad som börjat akut
- ▶ tydliga inflammationssymtom (smärta, rodnad, värmekänsla) i extremiteten/leden

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A01 - Smärta, allmän / flera platser
- ▶ A03 - Feber
- ▶ L08 - Symptom / besvär beträffande skuldra
- ▶ L09 - Symptom / besvär beträffande arm
- ▶ L10 - Symptom / besvär beträffande armbåge
- ▶ L11 - Symptom / besvär beträffande handlov
- ▶ L12 - Symptom / besvär beträffande hand & fingrar
- ▶ L13 - Symptom / besvär beträffande höft
- ▶ L14 - Symptom / besvär beträffande lår / vad
- ▶ L15 - Symptom / besvär beträffande knä
- ▶ L16 - Symptom / besvär beträffande vrist
- ▶ L17 - Symptom / besvär beträffande fot / tå
- ▶ L18 - Muskelsmärta
- ▶ L19 - Symptom / besvär beträffande flera muskler, ospecificerat
- ▶ L20 - Symptom / besvär beträffande flera leder, ospecificerat
- ▶ L28 - Funktionsbegränsning / handikapp i muskuloskeletala organ
- ▶ L29 - Symptom / besvär i muskler / leder, annat
- ▶ L70 - Infektion i muskuloskeletala organ
- ▶ N18 - Förlamning / svaghet
- ▶ S06 - Utslag, lokalt

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Höftbesvär hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Ledgångsreumatism hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Skador i extremitet

Publicerad: 28.03.2024

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt? Var är skadan?
- ▶ Synlig felställning
- ▶ Är det sår? Blödning?
- ▶ Nedre extremitet: Kan patienten stå på nedre extremiteten? Övre extremitet: Kan patienten använda övre extremiteten?

Se också

- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Extremitet/del av extremitet har lossnat
- ▶ Riklig blödning
- ▶ Svår felställning

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ öppen fraktur eller betydande hudskada
- ▶ led eller del av extremitet i felställning, kan inte stå på nedre extremiteten eller kan inte använda övre extremiteten
- ▶ symtom som passar nerv- eller blodcirkulationsproblem
- ▶ svår smärta i extremitet
- ▶ låst knä

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ efter en olyckshändelse använder barnet inte extremiteten eller haltar som nytt symptom

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ lindrig smärta orsakad av olyckshändelse där ovannämnda kriterier inte uppfylls
- ▶ låst knä, återkommande/går om

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A80 - Skada, ospecificerad
- ▶ A81 - Skador, multipla
- ▶ L72 - Fraktur av radius / ulna
- ▶ L73 - Fraktur av tibia / fibula
- ▶ L74 - Fraktur av handens / fotens ben
- ▶ L75 - Fraktur av lårbenet
- ▶ L76 - Fraktur, annan
- ▶ L77 - Stukning / försträckning av vrist
- ▶ L78 - Stukning / försträckning av knä
- ▶ L80 - Dislokationer
- ▶ L81 - Skada på muskuloskeletala systemet, annan
- ▶ L89 - Höftledsartros

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Bristning, sträckning och stukning:

Akut behandlingsprotokoll PEACE:

P-Protect (Skydda) = Undvik att lägga tyngd på den skadade kroppsdelens rörelser

E-Elevate (Höj) = Lyft det skadade området ovanför hjärtat.

A-Avoid anti-inflammatory modalities (Överväg) = Överväg noggrant behovet av smärtstillande läkemedel samt kyla för att vårda smärtan.

C-Compress (Applicera kompression) = Mekanisk kompression minskar svullenhet och blödning.

E-Educate (Ge anvisningar) = Aktiv rehabilitering läker skadan snabbare.

Vård efter det akuta tillståndet:

L-Load (Belasta) = Utsätt för belastning så fort som symtomen tillåter det.

O-Optimism (Håll dig positiv) = En positiv attityd främjar läkandet.

V-Vascularisation (Stöd återhämtningen av blodcirkulationen) = Motion sätter fart på blodcirkulationen och gör läkandet snabbare.

E-Exercise (Träna) = Påbörja så fort som möjligt rehabiliterande träning som hindrar nya skador från att ske.

1 - 6 år - Skador i extremitet

Publicerad: 28.03.2024

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt? Var är skadan?
- ▶ Synlig felställning
- ▶ Är det sår? Blödning?
- ▶ Nedre extremitet: Kan patienten stå på nedre extremiteten? Övre extremitet: Kan patienten använda övre extremiteten?

Se också

- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Extremitet/del av extremitet har lossnat
- ▶ Riklig blödning
- ▶ Svår felställning

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ öppen fraktur eller betydande hudskada
- ▶ led eller del av extremitet i felställning, kan inte stå på nedre extremiteten eller kan inte använda övre extremiteten
- ▶ symtom som passar nerv- eller blodcirkulationsproblem
- ▶ svår smärta i extremitet
- ▶ låst knä

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ lindrig smärta orsakad av olyckshändelse där ovannämnda kriterier inte uppfylls
- ▶ efter en olyckshändelse använder barnet inte extremiteten eller haltar som nytt symtom

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ låst knä, återkommande/går om

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A80 - Skada, ospecificerad
- ▶ A81 - Skador, multipla
- ▶ L72 - Fraktur av radius / ulna
- ▶ L73 - Fraktur av tibia / fibula
- ▶ L74 - Fraktur av handens / fotens ben
- ▶ L75 - Fraktur av lårbenet
- ▶ L76 - Fraktur, annan
- ▶ L77 - Stukning / försträckning av vrist
- ▶ L78 - Stukning / försträckning av knä
- ▶ L80 - Dislokationer
- ▶ L81 - Skada på muskuloskeletala systemet, annan
- ▶ L89 - Höftledsartros

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Bristning, sträckning och stukning:

Akut behandlingsprotokoll PEACE:

P-Protect (Skydda) = Undvik att lägga tyngd på den skadade kroppsdelens rörelser

E-Elevate (Höj) = Lyft det skadade området ovanför hjärtat.

A-Avoid anti-inflammatory modalities (Överväg) = Överväg noggrant behovet av smärtstillande läkemedel samt kyla för att vårda smärtan.

C-Compress (Applicera kompression) = Mekanisk kompression minskar svullenhet och blödning.

E-Educate (Ge anvisningar) = Aktiv rehabilitering läker skadan snabbare.

Vård efter det akuta tillståndet:

L-Load (Belasta) = Utsätt för belastning så fort som symtomen tillåter det.

O-Optimism (Håll dig positiv) = En positiv attityd främjar läkandet.

V-Vascularisation (Stöd återhämtningen av blodcirkulationen) = Motion sätter fart på blodcirkulationen och gör läkandet snabbare.

E-Exercise (Träna) = Påbörja så fort som möjligt rehabiliterande träning som hindrar nya skador från att ske.

3 - 12 mån - Skador i extremitet

Publicerad: 28.03.2024

Version: 6

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt? Var är skadan?
- ▶ Synlig felställning
- ▶ Är det sår? Blödning?
- ▶ Nedre extremitet: Kan patienten stå på nedre extremiteten? Övre extremitet: Kan patienten använda övre extremiteten?

Se också

- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Extremitet/del av extremitet har lossnat
- ▶ Riklig blödning
- ▶ Svår felställning

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ öppen fraktur eller betydande hudskada
- ▶ led eller del av extremitet i felställning, kan inte stå på nedre extremiteten eller kan inte använda övre extremiteten
- ▶ symtom som passar nerv- eller blodcirkulationsproblem
- ▶ efter en olyckshändelse använder barnet inte extremiteten eller haltar som nytt symtom
- ▶ svår smärta i extremitet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ lindrig smärta orsakad av olyckshändelse där ovannämnda kriterier inte uppfylls

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A80 - Skada, ospecificerad
- ▶ A81 - Skador, multipla
- ▶ L72 - Fraktur av radius / ulna
- ▶ L73 - Fraktur av tibia / fibula
- ▶ L74 - Fraktur av handens / fotens ben
- ▶ L75 - Fraktur av lårbenet
- ▶ L76 - Fraktur, annan
- ▶ L77 - Stukning / försträckning av vrist
- ▶ L78 - Stukning / försträckning av knä
- ▶ L80 - Dislokationer
- ▶ L81 - Skada på muskuloskeletala systemet, annan
- ▶ L89 - Höftledsartros

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Bröstmärta

Publicerad: 08.02.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Allmäntillstånd
- ▶ Är andningen avvikande?
- ▶ Feber?
- ▶ Är hudfärgen avvikande?
- ▶ Orkar barnet vara i gång?
- ▶ Fortsätter smärtan alltjämt?
- ▶ Blir smärtan värre i rörelse?
- ▶ Var smärtan som gått om kopplad till motion?
- ▶ Har patienten pacemaker?
- ▶ Har patienten medfött hjärtfel?
- ▶ Har patienten skadat bröstkorgen?
- ▶ Har det gjorts ingrepp i bröstkorgen?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Hosta
- ▶ Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Medvetandeförlust
- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Förvärrad bröstsmärta och strukturellt hjärtfel
- ▶ Strålningsmärta i armarna, halsen, ryggen
- ▶ Svår smärta och andnöd efter skada eller ingrepp
- ▶ Blånande hud

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Orkar inte leka
- ▶ Andnöd
- ▶ Kontinuerlig och kraftig smärta efter skada eller ingrepp
- ▶ Feber och bröstsmärta
- ▶ Pacemakerpatient
- ▶ Medfött hjärtfel
- ▶ Bröstsmärta som förvärras vid ansträngning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Upprepade korta sting i bröstet under ansträngning

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enstaka korta sting i bröstet under ansträngning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A11 - Bröstsmärta UNS
- ▶ K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten
- ▶ K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Bröstmärta

Publicerad: 08.02.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Allmäntillstånd
- ▶ Är andningen avvikande?
- ▶ Feber?
- ▶ Är hudfärgen avvikande?
- ▶ Orkar barnet leka?
- ▶ Fortsätter smärtan alltjämt?
- ▶ Blir smärtan värre i rörelse?
- ▶ Var smärtan som gått om kopplad till motion?
- ▶ Har patienten pacemaker?
- ▶ Har patienten medfött hjärtfel?
- ▶ Har patienten skadat bröstkorgen?
- ▶ Har det gjorts ingrepp i bröstkorgen?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Hosta
- ▶ Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Medvetandeförlust
- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Förvärrad bröstsmärta och strukturellt hjärtfel
- ▶ Strålningsmärta i armarna, halsen, ryggen
- ▶ Svår smärta och andnöd efter skada eller ingrepp
- ▶ Blånande hud

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Orkar inte leka
- ▶ Andnöd
- ▶ Kontinuerlig och kraftig smärta efter skada eller ingrepp
- ▶ Feber och bröstsmärta
- ▶ Pacemakerpatient
- ▶ Medfött hjärtfel
- ▶ Bröstsmärta som förvärras vid ansträngning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Upprepade korta sting i bröstet under ansträngning

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enstaka korta sting i bröstet under ansträngning

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A11 - Bröstsmärta UNS
- ▶ K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten
- ▶ K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Bröstsmärta

Publicerad: 08.02.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Allmäntillstånd
- ▶ Är andningen avvikande?
- ▶ Feber?
- ▶ Är hudfärgen avvikande?
- ▶ Orkar barnet äta/suga?
- ▶ Har patienten pacemaker?
- ▶ Har patienten medfött hjärtfel?
- ▶ Har patienten skadat bröstkorgen?
- ▶ Har det gjorts ingrepp i bröstkorgen?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Hosta
- ▶ Yrsel, balanssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Medvetslöshet
- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Blånande hud

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Äter / suger sämre
- ▶ Andnöd
- ▶ Kontinuerlig och kraftig smärta efter skada eller ingrepp
- ▶ Feber och bröstsmärta
- ▶ Pacemakerpatient
- ▶ Medfött hjärtfel

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A11 - Bröstsmärta UNS
- ▶ K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten
- ▶ K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Bröstsmärta

Publicerad: 08.02.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Allmäntillstånd
- ▶ Är andningen avvikande?
- ▶ Feber?
- ▶ Är hudfärgen avvikande?
- ▶ Orkar barnet äta/suga?
- ▶ Har patienten pacemaker?
- ▶ Har patienten medfött hjärtfel?
- ▶ Har patienten skadat bröstkorgen?
- ▶ Har det gjorts ingrepp i bröstkorgen?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Blånande hud

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Äter / suger sämre
- ▶ Andning som blivit tätare
- ▶ Kontinuerlig och kraftig smärta efter skada eller ingrepp
- ▶ Feber
- ▶ Pacemakerpatient
- ▶ Medfött hjärtfel

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A11 - Bröstsmärta UNS
- ▶ K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten
- ▶ K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Blodig avföring

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är blodet klart eller mörkt?
- ▶ Gör det ont att tömma tarmen?
- ▶ Är det blodränder, koagel i avföringen eller är blodet helt blandat i avföringen?
- ▶ Är det blod i varje avföring?
- ▶ Är det rikligt med blod (t.ex. ränder, koagel, en tesked, en matsked osv.)?
- ▶ Riklig tarmtömning?
- ▶ Feber?
- ▶ Har patienten andra allmänna symtom än feber?
- ▶ Finns det bondgårdsdjur i familjekretsen?
- ▶ Används råmjölk el.dyl.?

Se också

- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Diarrè
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Svåra symtom som börjat snabbt

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ blodig avföring och feber
- ▶ blodig avföring och hemvård lyckas inte (t.ex. att dricka)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ blodig avföring och diarré (allmäntillståndet bra och får i sig vätska)

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ blodig avföring, inga andra symtom

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Uppföljning om ett feberfritt och välmående spädbarn har blodränder i avföringen (kontakt till rådgivningen om det förekommer kontinuerligt/långvarigt)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D16 - Blödning från ändtarmen

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Blodig avföring hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Blod i avföringen - vad göra? \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Tarminflammationer \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Blodig avföring

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är blodet klart eller mörkt?
- ▶ Gör det ont att tömma tarmen?
- ▶ Är det blodränder, koagel i avföringen eller är blodet helt blandat i avföringen?
- ▶ Är det blod i varje avföring?
- ▶ Är det rikligt med blod (t.ex. ränder, koagel, en tesked, en matsked osv.)?
- ▶ Riklig tarmtömning?
- ▶ Feber?
- ▶ Har patienten andra allmänna symtom än feber?
- ▶ Finns det bondgårdsdjur i familjekretsen?
- ▶ Används råmjölk el.dyl.?

Se också

- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Diarrè
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Svåra symtom som börjat snabbt

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ blodig avföring och feber
- ▶ blodig avföring och hemvård lyckas inte (t.ex. att dricka)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ blodig avföring och diarré (allmäntillståndet bra och får i sig vätska)

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ blodig avföring, inga andra symtom

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Uppföljning om ett feberfritt och välmående spädbarn har blodränder i avföringen (kontakt till rådgivningen om det förekommer kontinuerligt/långvarigt)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D16 - Blödning från ändtarmen

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Blodig avföring hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Blod i avföringen - vad göra? \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Tarminflammationer \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Blodig avföring

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är blodet klart eller mörkt?
- ▶ Gör det ont att tömma tarmen?
- ▶ Är det blodränder, koagel i avföringen eller är blodet helt blandat i avföringen?
- ▶ Är det blod i varje avföring?
- ▶ Är det rikligt med blod (t.ex. ränder, koagel, en tesked, en matsked osv.)?
- ▶ Riklig tarmtömning?
- ▶ Feber?
- ▶ Har patienten andra allmänna symtom än feber?
- ▶ Finns det bondgårdsdjur i familjekretsen?
- ▶ Används råmjölk el.dyl.?

Se också

- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Diarrè
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Svåra symtom som börjat snabbt

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ blodig avföring och feber
- ▶ blodig avföring och hemvård lyckas inte (t.ex. att dricka)
- ▶ blodig avföring och diarré (allmäntillståndet bra och får i sig vätska)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ blodig avföring, inga andra symtom

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Uppföljning om ett feberfritt och välmående spädbarn har blodränder i avföringen (kontakt till rådgivningen om det förekommer kontinuerligt/långvarigt)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D16 - Blödning från ändtarmen

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Blodig avföring hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Blod i avföringen - vad göra? \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Tarminflammationer \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Främmande kropp

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och när?
- ▶ Andningssvårighet? Hosta? Gnäller?
- ▶ Dreglar? Kan patienten dricka/äta?
- ▶ Hurdant batteri? Stavbatteri? Knappcell? Batteriets storlek?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Hosta
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Kräkning
- ▶ Smärta eller symtom i könsorganen
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Svår smärta
- ▶ Rikliga kräkningar

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ i luftvägarna
- ▶ i matstrupen
- ▶ i huden (sticka, metkrok el.dyl.)
- ▶ patienten har svält flera magneter eller batterier
- ▶ patienten har svält en knappcell >15 mm
- ▶ rektum, vagina, urinröret

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ misstanke om främmande kropp, barnet symtomfritt

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ patienten har svält en knappcell
- ▶ Smärtmedicinering
- ▶ Batterier se vårdanvisning för förgiftningar (terveysportti)
- ▶ Att avlägsna små främmande kroppar från huden hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D79 - Främmande kropp genom naturlig öppning
- ▶ F76 - Främmande kropp i öga
- ▶ H76 - Främmande kropp i öra
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ S15 - Främmande kropp i huden
- ▶ X82 - Skador på kvinnliga genitalia
- ▶ Y80 - Skada på manliga könsorgan

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Främmande kropp i kroppen, näsan eller hörselgången \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Främmande kropp i näsan \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Olyckor med främmande kroppar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Främmande kropp

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och när?
- ▶ Andningssvårighet? Hosta? Gnäller?
- ▶ Dreglar? Kan patienten dricka/äta?
- ▶ Hurdant batteri? Stavbatteri? Knappcell? Batteriets storlek?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Hosta
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Kräkning
- ▶ Smärta eller symtom i könsorganen
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Svår smärta
- ▶ Rikliga kräkningar

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ i luftvägarna
- ▶ i matstrupen
- ▶ i huden (sticka, metkrok el.dyl.)
- ▶ patienten har svält flera magneter eller batterier
- ▶ patienten har svält en knappcell >15 mm
- ▶ rektum, vagina, urinröret

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ misstanke om främmande kropp, barnet symptomfritt

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ patienten har svält en knappcell
- ▶ Smärtmedicinering
- ▶ Batterier se vårdanvisning för förgiftningar (terveysportti)
- ▶ Att avlägsna små främmande kroppar från huden hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D79 - Främmande kropp genom naturlig öppning
- ▶ F76 - Främmande kropp i öga
- ▶ H76 - Främmande kropp i öra
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ S15 - Främmande kropp i huden
- ▶ X82 - Skador på kvinnliga genitalia
- ▶ Y80 - Skada på manliga könsorgan

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Främmande kropp i kroppen, näsan eller hörselgången \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Främmande kropp i näsan \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Olyckor med främmande kroppar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Främmande kropp

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och när?
- ▶ Andningssvårighet? Hosta? Gnäller?
- ▶ Dreglar? Kan patienten dricka/äta?
- ▶ Hurdant batteri? Stavbatteri? Knappcell? Batteriets storlek?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Hosta
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Kräkning
- ▶ Smärta eller symtom i könsorganen
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Svår smärta
- ▶ Rikliga kräkningar

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ i luftvägarna
- ▶ i matstrupen
- ▶ i huden (sticka, metkrok el.dyl.)
- ▶ patienten har svält flera magneter eller batterier
- ▶ patienten har svält en knappcell >15 mm
- ▶ patienten har svält en knappcell
- ▶ rektum, vagina, urinröret

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ misstanke om främmande kropp, barnet symtomfritt

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering
- ▶ Batterier se vårdanvisning för förgiftningar (terveysportti)
- ▶ Att avlägsna små främmande kroppar från huden hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ D79 - Främmande kropp genom naturlig öppning
- ▶ F76 - Främmande kropp i öga
- ▶ H76 - Främmande kropp i öra
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ S15 - Främmande kropp i huden
- ▶ X82 - Skador på kvinnliga genitalia
- ▶ Y80 - Skada på manliga könsorgan

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Främmande kropp i kroppen, näsan eller hörselgången \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Främmande kropp i näsan \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Olyckor med främmande kroppar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Urineringsproblem

Publicerad: 09.04.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Klarar patienten sig med smärtan?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Smärta eller symtom i könsorganen

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ urinretention
- ▶ symtom på urinvägsinfektion med feber
- ▶ urogenitalt trauma
- ▶ blod i urinen och allmänpåverkan
- ▶ ökat urineringsbehov och nedsatt allmäntillstånd
- ▶ diabetesmisstanke (t.ex. ökat urineringsbehov, törst, trötthet)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ blod i urinen utan trauma och/eller allmän påverkan

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ ökat urineringsbehov

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ dag- eller nattinkontinens (hos torrt barn)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ U01 - Smärta vid urinering/dysuri
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri
- ▶ U06 - Blod i urinen
- ▶ U08 - Urinretention
- ▶ U70 - Pyelonefrit/njurbäckeninflammation
- ▶ U71 - Blåskatarr/cystit/annan urinvägsinfektion
- ▶ U72 - Uretrit
- ▶ U80 - Skada på urinorgan
- ▶ U85 - Medfödd missbildning i urinvägarna

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Inkontinens \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Vita \(protein\) i urinen hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Problem med urinvägarna hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Urineringsproblem

Publicerad: 09.04.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Klarar patienten sig med smärtan?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Smärta eller symtom i könsorganen

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ urinretention
- ▶ symtom på urinvägsinfektion med feber
- ▶ urogenitalt trauma
- ▶ blod i urinen och allmänpåverkan
- ▶ ökat urineringsbehov och nedsatt allmäntillstånd
- ▶ diabetesmisstanke (t.ex. ökat urineringsbehov, törst, trötthet)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ blod i urinen utan trauma och/eller allmän påverkan

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ ökat urineringsbehov

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ dag- eller nattinkontinens (hos torrt barn)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ U01 - Smärta vid urinering/dysuri
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri
- ▶ U06 - Blod i urinen
- ▶ U08 - Urinretention
- ▶ U70 - Pyelonefrit/njurbäckeninflammation
- ▶ U71 - Blåskatarr/cystit/annan urinvägsinfektion
- ▶ U72 - Uretrit
- ▶ U80 - Skada på urinorgan
- ▶ U85 - Medfödd missbildning i urinvägarna

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Inkontinens \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Vita \(protein\) i urinen hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Problem med urinvägarna hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Urineringsproblem

Publicerad: 09.04.2024

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Klarar patienten sig med smärtan?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Smärta eller symtom i könsorganen

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ urinretention
- ▶ symtom på urinvägsinfektion med feber
- ▶ urogenitalt trauma
- ▶ blod i urinen och allmänpåverkan
- ▶ ökat urineringsbehov och nedsatt allmäntillstånd
- ▶ diabetesmisstanke (t.ex. ökat urineringsbehov, törst, trötthet)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ blod i urinen utan trauma och/eller allmän påverkan

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ ökat urineringsbehov

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ U01 - Smärta vid urinering/dysuri
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri
- ▶ U06 - Blod i urinen
- ▶ U08 - Urinretention
- ▶ U70 - Pyelonefrit/njurbäckeninflammation
- ▶ U71 - Blåskatarr/cystit/annan urinvägsinfektion
- ▶ U72 - Uretrit
- ▶ U80 - Skada på urinorgan
- ▶ U85 - Medfödd missbildning i urinvägarna

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Inkontinens \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Vita \(protein\) i urinen hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Problem med urinvägarna hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Hosta

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ När har hostan börjat?
- ▶ Är andningen normal?
- ▶ Kan barnet dricka?
- ▶ Kan barnet prata?
- ▶ Kan barnet göra sina dagliga sysslor?
- ▶ Har barnet feber?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd, blå hudfärg
- ▶ Hosta och kraftiga andningssvårigheter

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Kraftig hosta som börjat akut och misstanke om främmande kropp
- ▶ Hosta och andningssvårighet
- ▶ Kontinuerlig, störande hosta

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Hosta och feber i över 3 dygn

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Långvarig hosta över 2 veckor

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Misstanke om astma

Rådgivning / hemvård

- ▶ Vård hemma med honung och/eller salva som smörjs på bröstkorgen
- ▶ Skällande hosta, se Andnöd
- ▶ Det är inte farligt att kräkas upp slem till följd av hosta

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R05 - Hosta
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Hosta

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ När har hostan börjat?
- ▶ Är andningen normal?
- ▶ Kan barnet dricka?
- ▶ Kan barnet prata?
- ▶ Kan barnet leka?
- ▶ Har barnet feber?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Lamt, slapt barn
- ▶ Hosta och kraftiga andningssvårigheter
- ▶ Blå hudfärg

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Kraftig hosta som börjat akut och misstanke om främmande kropp
- ▶ Hosta och andningssvårighet
- ▶ Kontinuerlig, störande hosta

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Hosta och feber i över 3 dygn

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Långvarig hosta över 2 veckor

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Misstanke om astma

Rådgivning / hemvård

- ▶ Vård hemma med honung och/eller salva som smörjs på bröstkorgen
- ▶ Skällande hosta, se Andnöd
- ▶ Det är inte farligt att kräkas upp slem till följd av hosta

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R05 - Hosta
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Hosta

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ När har hostan börjat?
- ▶ Är andningen normal?
- ▶ Kan babyn äta/dricka?
- ▶ Har babyn fått vaccinationerna (kikhosta)?
- ▶ Har babyn normal färg?
- ▶ Har babyn feber?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Främmande kropp

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Hosta och kraftiga andningssvårigheter
- ▶ Blå hudfärg
- ▶ Lamt, slapt barn

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Kontinuerlig hosta
- ▶ Kraftig hosta som börjat akut och misstanke om främmande kropp
- ▶ Hosta och andningssvårighet

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Hosta och feber i över 3 dygn
- ▶ Långvarig hosta över 2 veckor

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R05 - Hosta
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Hosta

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ När har hostan börjat?
- ▶ Har andra i familjen hosta?
- ▶ Är andningen normal?
- ▶ Har babyn normal färg?
- ▶ Kan babyn dricka?
- ▶ Har babyn feber?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka
- ▶ Andningsuppehåll
- ▶ Kontinuerlig hosta
- ▶ Blå hudfärg
- ▶ Andningssvårighet

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Babyn orkar inte äta
- ▶ Tät andning
- ▶ Feber >38 C

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Hosta som inte stör babys ätande eller andning

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ R02 - Andnöd / dyspné
- ▶ R03 - Pipande andning
- ▶ R05 - Hosta
- ▶ R21 - Symptom / klagomål beträffande strupen
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R96 - Astma

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Buksmärta, förstoppning

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Var känns symtomet? Har det bytt ställe? Vibrationskänslighet?
- ▶ Feber, kräkning, diarré?
- ▶ Kan patienten dricka/äta?
- ▶ Hudfärg (gul)?

Se också

- ▶ Blodig avföring
- ▶ Diarré
- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Krockpatient eller patient som fallit
- ▶ Kräkning

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ svår buksmärt
- ▶ buksmärt efter olyckshändelse
- ▶ buksmärt och blodig avföring
- ▶ buksmärt och nedsatt allmäntillstånd
- ▶ misstanke om inklämt bräck

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ buksmärt med svår diarré eller kräkningar

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ lindrig förstoppning/svårighet med tarmfunktionen i anslutning till buksmärt
- ▶ långvarig lindrig buksmärt, inga andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ B76 - Mjältruptur, traumatisk
- ▶ D01 - Buksmärta / magkramp, allmän
- ▶ D02 - Magsmärta / värk i epigastriet
- ▶ D03 - Halsbränna
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D12 - Förstoppning
- ▶ D13 - Gulsot
- ▶ D72 - Virushepatit
- ▶ D91 - Annat bukbräck

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Celiaki hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Buksmärta hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande buksmärta hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Förstoppning hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Buksmärta, förstoppning

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Var känns symtomet? Har det bytt ställe? Vibrationskänslighet?
- ▶ Feber, kräkning, diarré?
- ▶ Kan patienten dricka/äta?
- ▶ Hudfärg (gul)?

Se också

- ▶ Blodig avföring
- ▶ Diarré
- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Krockpatient eller patient som fallit
- ▶ Kräkning

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ svår buksmärt
- ▶ buksmärt efter olyckshändelse
- ▶ buksmärt med svår diarré eller kräkningar
- ▶ buksmärt och blodig avföring
- ▶ buksmärt och nedsatt allmäntillstånd
- ▶ misstanke om inklämt bråck

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ lindrig förstoppning/svårighet med tarmfunktionen i anslutning till buksmärt
- ▶ långvarig lindrig buksmärt, inga andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ B76 - Mjältruptur, traumatisk
- ▶ D01 - Buksmärta / magkramp, allmän
- ▶ D02 - Magsmärta / värk i epigastriet
- ▶ D03 - Halsbränna
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D12 - Förstoppning
- ▶ D13 - Gulsot
- ▶ D72 - Virushepatit
- ▶ D91 - Annat bukbräck

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Celiaki hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Buksmärta hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande buksmärta hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Förstoppning hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Buksmärta, förstoppning

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Var känns symtomet? Har det bytt ställe? Vibrationskänslighet?
- ▶ Feber, kräkning, diarré?
- ▶ Kan patienten dricka/äta?
- ▶ Hudfärg (gul)?

Se också

- ▶ Blodig avföring
- ▶ Diarré
- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Krockpatient eller patient som fallit
- ▶ Kräkning

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ svår buksmärt
- ▶ buksmärt efter olyckshändelse
- ▶ buksmärt med svår diarré eller kräkningar
- ▶ buksmärt och blodig avföring
- ▶ buksmärt och nedsatt allmäntillstånd
- ▶ misstanke om inklämt bråck

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ lindrig förstoppning/svårighet med tarmfunktionen i anslutning till buksmärt
- ▶ långvarig lindrig buksmärt, inga andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ B76 - Mjältruftur, traumatisk
- ▶ D01 - Buksmärta / magkramp, allmän
- ▶ D02 - Magsmärta / värk i epigastriet
- ▶ D03 - Halsbränna
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D12 - Förstoppning
- ▶ D13 - Gulsot
- ▶ D72 - Virushepatit
- ▶ D91 - Annat bukbräck

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Celiaki hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Buksmärta hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Återkommande buksmärta hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Förstoppning hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Avvikande blodsockervariation

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ När upptäcktes det?
- ▶ Har man mätt från olika ställen?
- ▶ Är stället man mätt från rent?
- ▶ Hur lång tid är det sedan patienten åt?
- ▶ Har ketonämnen mätts?
- ▶ Finns det något avvikande i andningen?
- ▶ Förekommer andra symtom (kräkning, huvudvärk, trötthet)?
- ▶ Har patienten feber eller annan infektion som bäst?
- ▶ Känner man till kontaktuppgifterna till den egna vårdplatsen? Är det möjligt att ringa dit?

Se också

- ▶ Diarré
- ▶ Feber
- ▶ Kräkning
- ▶ Urineringsproblem

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Avvikande andning

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Oförklarlig hyperglykemi
- ▶ Oförklarlig hypoglykemi
- ▶ Diabetes, hyperglykemi, ej ketos, bs korrigeras inte med hemanvisningar eller infektion
- ▶ Diabetes, hyperglykemi, ketos
- ▶ Diabetes, hypoglykemi, blodsockret hålls inte under kontroll eller patienten kräks
- ▶ Diabetes och kräkningar, kan inte dricka

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Konstaterad DM och hyperglykemi: instruktion om att mäta ketoämnen och injicera insulin enligt hemanvisningarna
- ▶ Konstaterad DM och hypoglykemi: instruktion om att mäta ketoämnen och ta kolhydrater

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ T01 - Överdriven törst
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T87 - Hypoglykemi
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto:Diabetes hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Avvikande blodsockervariation

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ När upptäcktes det?
- ▶ Har man mätt från olika ställen?
- ▶ Är stället man mätt från rent?
- ▶ Hur lång tid är det sedan patienten åt?
- ▶ Har ketonämnen mätts?
- ▶ Finns det något avvikande i andningen?
- ▶ Förekommer andra symtom (kräkning, huvudvärk, trötthet)?
- ▶ Har patienten feber eller annan infektion som bäst?
- ▶ Känner man till kontaktuppgifterna till den egna vårdplatsen? Är det möjligt att ringa dit?

Se också

- ▶ Diarré
- ▶ Feber
- ▶ Kräkning
- ▶ Urineringsproblem

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Avvikande andning

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Oförklarlig hyperglykemi
- ▶ Oförklarlig hypoglykemi
- ▶ Diabetes, hyperglykemi, ej ketos, bs korrigeras inte med hemanvisningar eller infektion
- ▶ Diabetes, hyperglykemi, ketos
- ▶ Diabetes, hypoglykemi, blodsockret hålls inte under kontroll eller patienten kräks
- ▶ Diabetes och kräkningar, kan inte dricka

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Konstaterad DM och hyperglykemi: instruktion om att mäta ketoämnen och injicera insulin enligt hemanvisningarna
- ▶ Konstaterad DM och hypoglykemi: instruktion om att mäta ketoämnen och ta kolhydrater

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ T01 - Överdriven törst
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T87 - Hypoglykemi
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto:Diabetes hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Avvikande blodsockervariation

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slapt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ När upptäcktes det?
- ▶ Har man mätt från olika ställen?
- ▶ Är stället man mätt från rent?
- ▶ Hur lång tid är det sedan patienten åt?
- ▶ Har ketonämnen mätts?
- ▶ Finns det något avvikande i andningen?
- ▶ Förekommer andra symtom (kräkning, huvudvärk, trötthet)?
- ▶ Har patienten feber eller annan infektion som bäst?
- ▶ Känner man till kontaktuppgifterna till den egna vårdplatsen? Är det möjligt att ringa dit?

Se också

- ▶ Diarré
- ▶ Feber
- ▶ Kräkning
- ▶ Urineringsproblem

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Avvikande andning

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Oförklarlig hyperglykemi
- ▶ Oförklarlig hypoglykemi
- ▶ Diabetes, hyperglykemi, ej ketos, bs korrigeras inte med hemanvisningar eller infektion
- ▶ Diabetes, hyperglykemi, ketos
- ▶ Diabetes, hypoglykemi, blodsockret hålls inte under kontroll eller patienten kräks
- ▶ Diabetes och kräkningar, kan inte dricka

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Konstaterad DM och hyperglykemi: instruktion om att mäta ketoämnen och injicera insulin enligt hemanvisningarna
- ▶ Konstaterad DM och hypoglykemi: instruktion om att mäta ketoämnen och ta kolhydrater

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ T01 - Överdriven törst
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T87 - Hypoglykemi
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto:Diabetes hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Ögonsymtom, synstörning

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Hur länge pågår det?
- ▶ Symtom i ena eller båda ögonen?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ misstanke om främmande kropp i ögat
- ▶ ögonsvullnad, rodnad, feber
- ▶ ögonsmärta
- ▶ ögonens ljuskänslighet
- ▶ hängande ögonlock
- ▶ ögonskada
- ▶ akut försämring av synen
- ▶ akut skelning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ var/varig ögoninflammation
- ▶ akut känsla av skräp i ögat, ingen synlig främmande kropp, inga andra symtom
- ▶ dubbelseende på båda ögonen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ dubbelseende på ena ögat
- ▶ annan synstörning

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ rodnad i ögat och allergisymtom
- ▶ ögat varas, inga andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anvisning om allergimedicin (om konstaterad allergi eller pollentid)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ F01 - Ögonsmärta
- ▶ F02 - Rött öga
- ▶ F03 - Tårflöde/varbildning i ögat
- ▶ F05 - Störning i synförmåga, annan
- ▶ F70 - Konjunktivit, infektiös
- ▶ F71 - Konjunktivit, allergisk
- ▶ F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga
- ▶ F79 - Skada på ögonen, annan
- ▶ F80 - Töppt tårkanal hos nyfödd
- ▶ F95 - Skelning

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Ögonsymtom, synstörning

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Hur länge pågår det?
- ▶ Symtom i ena eller båda ögonen?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ misstanke om främmande kropp i ögat
- ▶ ögonsvullnad, rodnad, feber
- ▶ ögonsmärta
- ▶ ögonens ljuskänslighet
- ▶ hängande ögonlock
- ▶ ögonskada
- ▶ akut försämring av synen
- ▶ akut skelning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ var/varig ögoninflammation
- ▶ akut känsla av skräp i ögat, ingen synlig främmande kropp, inga andra symtom
- ▶ dubbelseende på båda ögonen

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ dubbelseende på ena ögat
- ▶ annan synstörning

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ rodnad i ögat och allergisymtom
- ▶ ögat varas, inga andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anvisning om allergimedicin (om konstaterad allergi eller pollentid)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ F01 - Ögonsmärta
- ▶ F02 - Rött öga
- ▶ F03 - Tårflöde/varbildning i ögat
- ▶ F05 - Störning i synförmåga, annan
- ▶ F70 - Konjunktivit, infektiös
- ▶ F71 - Konjunktivit, allergisk
- ▶ F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga
- ▶ F79 - Skada på ögonen, annan
- ▶ F80 - Täppt tårkanal hos nyfödd
- ▶ F95 - Skelning

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Skelning hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Synstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Ögonsymtom, synstörning

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har symtomet börjat?
- ▶ Hur länge pågår det?
- ▶ Symtom i ena eller båda ögonen?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ misstanke om främmande kropp i ögat
- ▶ ögonsvullnad, rodnad, feber
- ▶ ögonsmärta
- ▶ ögonens ljuskänslighet
- ▶ hängande ögonlock
- ▶ ögonskada
- ▶ akut försämring av synen
- ▶ akut skelning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ var/varig ögoninflammation
- ▶ akut känsla av skräp i ögat, ingen synlig främmande kropp, inga andra symtom

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ rodnad i ögat och allergisymtom
- ▶ ögat varas, inga andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anvisning om allergimedicin (om konstaterad allergi eller pollentid)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ F01 - Ögonsmärta
- ▶ F02 - Rött öga
- ▶ F03 - Tårflöde/varbildning i ögat
- ▶ F05 - Störning i synförmåga, annan
- ▶ F70 - Konjunktivit, infektiös
- ▶ F71 - Konjunktivit, allergisk
- ▶ F75 - Kontusion / blodutgjutning i öga
- ▶ F79 - Skada på ögonen, annan
- ▶ F80 - Töppt tårkanal hos nyfödd
- ▶ F95 - Skelning

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Skelning hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Synstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Har det gjorts polisanmälan?
- ▶ Har det gjorts barnskyddsanmälan?
- ▶ Familjens situation
- ▶ Barnläkare konsulteras
- ▶ Uppmaning att göra polisanmälan
- ▶ Iaktta lokala anvisningar

Se också

- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Brännskador
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)
- ▶ Skador i extremitet
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Risksituationen fortsätter
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Svåra skador

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ utnyttjande
- ▶ misshandel
- ▶ övergrepp

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ Z25 - Problem relaterade till misshandel / skadliga händelser

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Har det gjorts polisanmälan?
- ▶ Har det gjorts barnskyddsanmälan?
- ▶ Familjens situation
- ▶ Barnläkare konsulteras
- ▶ Uppmaning att göra polisanmälan
- ▶ Iaktta lokala anvisningar

Se också

- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Brännskador
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)
- ▶ Skador i extremitet
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Risksituationen fortsätter
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Svåra skador

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ utnyttjande
- ▶ misshandel
- ▶ övergrepp

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ Z25 - Problem relaterade till misshandel / skadliga händelser

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Har det gjorts polisanmälan?
- ▶ Har det gjorts barnskyddsanmälan?
- ▶ Familjens situation
- ▶ Barnläkare konsulteras
- ▶ Uppmaning att göra polisanmälan
- ▶ Iaktta lokala anvisningar

Se också

- ▶ Ansiktsskada
- ▶ Brännskador
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Skador i extremitet
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Risksituationen fortsätter
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Andningssvårighet
- ▶ Svåra skador

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ utnyttjande
- ▶ misshandel
- ▶ övergrepp

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ Z25 - Problem relaterade till misshandel / skadliga händelser

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Diarrè

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Hur länge har patienten haft symtom?
- ▶ Hur mycket symtom?
- ▶ Hur är allmänna måendet?
- ▶ Lyckas rehydrering?
- ▶ Har patienten varit utomlands?
- ▶ Har patienten bloddiarré?
- ▶ Har patienten varit i kontakt med bondgårdsdjur?
- ▶ Är ögonen infallna?
- ▶ Var går temperatursgränsen?

Se också

- ▶ Blodig avföring
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Kräkning

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ diarré och misstanke om uttorkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ diarré och buksmärta som inte lättar

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ återkommande diarré utan tecken på uttorkning

Tidsbokning utan brådskan (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ett bra allmäntillstånd tillåter rehydrering hemma: Rehydrationsanvisning
- ▶ Konstaterad inflammatorisk tarmsjukdom som blivit värre och allmäntillståndet bra:
▶ kontakt till egen vårdenhet

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D12 - Förstoppning
- ▶ D15 - Melena
- ▶ D73 - Gastroenterit, förmodad infektion
- ▶ D93 - Colon irritabile
- ▶ D94 - Crohns sjukdom / ulcerös kolit
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T11 - Dehydrering
- ▶ T87 - Hypoglykemi

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Diarrè

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Hur länge har patienten haft symtom?
- ▶ Hur mycket symtom?
- ▶ Hur är allmänna måendet?
- ▶ Lyckas rehydrering?
- ▶ Har patienten varit utomlands?
- ▶ Har patienten bloddiarré?
- ▶ Har patienten varit i kontakt med bondgårdsdjur?
- ▶ Är ögonen infallna?
- ▶ Var går temperatursgränsen?

Se också

- ▶ Blodig avföring
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Kräkning

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ diarré och misstanke om uttorkning

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ diarré och buksmärta som inte lättar

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ återkommande diarré utan tecken på uttorkning

Tidsbokning utan brådskan (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ett bra allmäntillstånd tillåter rehydrering hemma: Rehydrationsanvisning
- ▶ Konstaterad inflammatorisk tarmsjukdom som blivit värre och allmäntillståndet bra:
▶ kontakt till egen vårdenhet

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D12 - Förstoppning
- ▶ D15 - Melena
- ▶ D73 - Gastroenterit, förmodad infektion
- ▶ D93 - Colon irritabile
- ▶ D94 - Crohns sjukdom / ulcerös kolit
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T11 - Dehydrering
- ▶ T87 - Hypoglykemi

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Diarrè

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Hur länge har patienten haft symtom?
- ▶ Hur mycket symtom?
- ▶ Hur är allmänna måendet?
- ▶ Lyckas rehydrering?
- ▶ Har patienten varit utomlands?
- ▶ Har patienten bloddiarré?
- ▶ Har patienten varit i kontakt med bondgårdsdjur?
- ▶ Är ögonen infallna?
- ▶ Var går temperatursgränsen?

Se också

- ▶ Blodig avföring
- ▶ Buksmärta, förstoppning
- ▶ Feber
- ▶ Kräkning

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt medvetandegrad
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ diarré och misstanke om uttorkning
- ▶ diarré och buksmärta som inte lättar

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ återkommande diarré utan tecken på uttorkning

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ett bra allmäntillstånd tillåter rehydrering hemma: Rehydrationsanvisning
- ▶ Konstaterad inflammatorisk tarmsjukdom som blivit värre och allmäntillståndet bra: kontakt till egen vårdenhet

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ D06 - Lokaliserad buksmärta, annan
- ▶ D09 - Illamående
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ D11 - Diarré
- ▶ D12 - Förstoppning
- ▶ D15 - Melena
- ▶ D73 - Gastroenterit, förmodad infektion
- ▶ D93 - Colon irritabile
- ▶ D94 - Crohns sjukdom / ulcerös kolit
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T11 - Dehydrering
- ▶ T87 - Hypoglykemi

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Känns det fortfarande?
- ▶ Med vilka ord beskriver patienten själv känslan? (bultande, grumlig syn, bröstsmärta, stickningar i bröstet, brännande smärta, tryck, andnöd)
- ▶ Har patienten tidigare haft anfallsaktiga eller samma symtom?
- ▶ Hänger det ihop med ansträngning och gick det om vid vila?
- ▶ Har patienten feber nu eller har hen haft feber tidigare (1-2 veckor) eller någon tydlig infektion (resp./kräksjuka)?
- ▶ Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?
- ▶ Allmäntillståndet?
- ▶ Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Hosta
- ▶ Svalgsymtom och halsont

Nödsituation - 112

- ▶ Pågående anfall
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Bröstmärta/medvetlöshetsanfall mitt under ansträngning (s.a.s. I farten, inte efter att ha stannat upp)
- ▶ Känning i bröstet (hurdan som helst) vid ansträngning och infektion (som gått om) 1-2 veckor.

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Rytinstörningsanfall eller också misstanke om anfall
- ▶ Nedsatt medvetandegrad efter rytinstörnings-/medvetlöshetsanfall, kontinuerlig bröstmärta
- ▶ Bröstmärta och feber
- ▶ Känning i bröstet vid ansträngning, gått om med vila (föregått av infektion)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ återkommande rytinstörningsanfall och/eller känning i bröstet, inga andra symtom

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Oregelbunden puls, inga andra symtom
- ▶ Känning/stickningar i bröstet, gått om (inga symtom nu)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ge anvisning för pulsmätning, identifiera normala andningsarytmin
- ▶ Om patienten har en känsla av stick i axeln vid ansträngning och inga andra symtom - anvisning om att vila och vid behov ta smärtmedicin. Kontakta primärvården på vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A06 - Svimning
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A11 - Bröstsmärta UNS
- ▶ K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten
- ▶ K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan
- ▶ K80 - Hjärtarrytmi UNS

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Bröstmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Känns det fortfarande?
- ▶ Med vilka ord beskriver patienten själv känslan? (bultande, grumlig syn, bröstsmärta, stickningar i bröstet, brännande smärta, tryck, andnöd)
- ▶ Har patienten tidigare haft anfallsaktiga eller samma symtom?
- ▶ Hänger det ihop med ansträngning och gick det om vid vila?
- ▶ Har patienten feber nu eller har hen haft feber tidigare (1-2 veckor) eller någon tydlig infektion (resp./kräksjuka)?
- ▶ Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?
- ▶ Allmäntillståndet?
- ▶ Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Halsont
- ▶ Hosta

Nödsituation - 112

- ▶ Pågående anfall
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Bröstsmärta/medvetlöshetsanfall mitt under ansträngning (s.a.s. I farten, inte efter att ha stannat upp)
- ▶ Känning i bröstet (hurdan som helst) vid ansträngning och infektion (som gått om) 1-2 veckor.

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Rytinstörningsanfall eller också misstanke om anfall
- ▶ Nedsatt medvetandegrad efter rytinstörnings-/medvetlöshetsanfall, kontinuerlig bröstsmärta
- ▶ Bröstsmärta och feber
- ▶ Känning i bröstet vid ansträngning, gått om med vila (föregått av infektion)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ återkommande rytinstörningsanfall och/eller känning i bröstet, inga andra symtom

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Oregelbunden puls, inga andra symtom
- ▶ Känning/stickningar i bröstet, gått om (inga symtom nu)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ge anvisning för pulsmätning, identifiera normala andningsarytmin
- ▶ Om patienten har en känsla av stick i axeln vid ansträngning och inga andra symtom - anvisning om att vila och vid behov ta smärtmedicin. Kontakta primärvården på vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A06 - Svimning
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A11 - Bröstsmärta UNS
- ▶ K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten
- ▶ K05 - Avvikande / oregelbunden hjärtrytm / puls, annan
- ▶ K80 - Hjärtarrytmi UNS

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Bröstsmärta, rytmstörning, medvetslöshet vid ansträngning, oregelbunden puls, stickningar i bröstet

Publicerad: 19.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Känns det fortfarande?
- ▶ Med vilka ord beskriver patienten själv känslan? (bultande, grumlig syn, bröstsmärta, stickningar i bröstet, brännande smärta, tryck, andnöd)
- ▶ Har patienten tidigare haft anfallsaktiga eller samma symtom?
- ▶ Hänger det ihop med ansträngning och gick det om vid vila?
- ▶ Har patienten feber nu eller har hen haft feber tidigare (1-2 veckor) eller någon tydlig infektion (resp./kräksjuka)?
- ▶ Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?
- ▶ Allmäntillståndet?
- ▶ Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber
- ▶ Halsont
- ▶ Hosta

Nödsituation - 112

- ▶ Pågående anfall
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Bröstsmärta/medvetlöshetsanfall mitt under ansträngning (s.a.s. I farten, inte efter att ha stannat upp)
- ▶ Känning i bröstet (hurdan som helst) vid ansträngning och infektion (som gått om) 1-2 veckor.

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Rytinstörningsanfall eller också misstanke om anfall
- ▶ Nedsatt medvetandegrad efter rytinstörnings-/medvetlöshetsanfall, kontinuerlig bröstsmärta
- ▶ återkommande rytinstörningsanfall och/eller känning i bröstet, inga andra symtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Oregelbunden puls, inga andra symtom

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Ge anvisning för pulsmätning, identifiera normala andningsarytmin
- ▶ Om patienten har en känsla av stick i axeln vid ansträngning och inga andra symtom - anvisning om att vila och vid behov ta smärtmedicin. Kontakta primärvården på vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A06 - Svimning
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ A11 - Bröstsmärta UNS
- ▶ K04 - Hjärtklappning / medvetenhet om hjärtverksamheten
- ▶ K05 - Avvikande / oregelbunden hjartrytm / puls, annan
- ▶ K80 - Hjärtarrytmi UNS

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Symtomens början och varaktighet
- ▶ Barnets psykiska tillstånd
- ▶ Barnets övriga sjukdomar
- ▶ Familjens situation
- ▶ Föräldrarnas förmåga/möjlighet att skydda barnet
- ▶ Barnets vardagliga funktionsförmåga
- ▶ Åldersnivå

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation - 112

- ▶ Behov av handräckning
- ▶ Farligt destruktivt beteende eller fara för det
- ▶ Akut psykotiskt tillstånd och/eller självdestruktivitet
- ▶ Hotande situation

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Akut krissituation i familjen, där barnets fysiska eller psykiska hälsa är hotad och enbart barnskyddets åtgärder är inte tillräckliga
- ▶ Misstanke om akut psykos
- ▶ Rastlöshet, kraftig ångest, speciellt beteende, sömnlöshet, självdestruktivitet, aggressivitet, isolering, syn- eller hörselhallucinationer
- ▶ Humör-, ångest- eller ätstörning har akut blivit värre så att barnets eller familjens funktionsförmåga har försämrats väsentligt
- ▶ självdestruktivitet
- ▶ panikångestsymtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ patienter med depressionssymtom

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ sömnlöshet

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Existerande vårdkontakt
- ▶ Kännedom om följande mottagningstid
- ▶ Situationen är lugn
- ▶ Vid behov styrs samtalet framåt till vårdande enheten

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ P01 - Känsla av ångest / nervositet / spänning
- ▶ P04 - Retlighet / retligt beteende
- ▶ P06 - Sömnrubbing
- ▶ P10 - Stamning / skenande tal / tics
- ▶ P11 - Problem med ätande hos barn
- ▶ P12 - Sängvätning / enures
- ▶ P13 - Enkopres
- ▶ P22 - Beteende symtom / besvär hos barn
- ▶ P23 - Beteende symtom / besvär hos ungdom
- ▶ P24 - Specifikt inlärningsproblem
- ▶ P75 - Somatiseringssyndrom
- ▶ P76 - Depressiv sjukdom
- ▶ P77 - Självmord / självmordsförsök
- ▶ P79 - Fobi/ obsessiv-kompulsiv störning
- ▶ P86 - Anorexia nervosa / bulimi

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: ADHD - en fungerande vardag med tidigt stöd \(God medicinsk praxisrekommendation\).\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Autismspektrumtillstånd \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Barnsängspsykos \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Beteendestörning hos barn och unga \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Depression och affektiv störning hos barn och unga \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Sexuellt utnyttjande av barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Trottsyndrom hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Rastlöst barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Specifik rädsla \(fobi\).\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Sömnstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Psykiska symtom (ångest, aggressivitet, självdestruktivitet, beteendestörning, depression, ätstörning)

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Symtomens början och varaktighet
- ▶ Barnets psykiska tillstånd
- ▶ Barnets övriga sjukdomar
- ▶ Familjens situation
- ▶ Föräldrarnas förmåga/möjlighet att skydda barnet
- ▶ Barnets vardagliga funktionsförmåga
- ▶ Åldersnivå

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Sexualbrottmisstanke, utnyttjande, övergrepp, misshandel
- ▶ Symtom i extremitet (ej kännedom om olyckshändelse)

Nödsituation - 112

- ▶ Behov av handräckning
- ▶ Farligt destruktivt beteende eller fara för det
- ▶ Akut psykotiskt tillstånd och/eller självdestruktivitet
- ▶ Hotande situation

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Akut krissituation i familjen, där barnets fysiska eller psykiska hälsa är hotad och enbart barnskyddets åtgärder är inte tillräckliga
- ▶ Misstanke om akut psykos
- ▶ Rastlöshet, kraftig ångest, speciellt beteende, sömnlöshet, självdestruktivitet, aggressivitet, isolering, syn- eller hörselhallucinationer
- ▶ Humör-, ångest- eller ätstörning har akut blivit värre så att barnets eller familjens funktionsförmåga har försämrats väsentligt
- ▶ självdestruktivitet
- ▶ panikångestsymtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ patienter med depressionssymtom

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ sömnlöshet

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Existerande vårdkontakt
- ▶ Kännedom om följande mottagningstid
- ▶ Situationen är lugn
- ▶ Vid behov styrs samtalet framåt till vårdande enheten

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ P01 - Känsla av ångest / nervositet / spänning
- ▶ P04 - Retlighet / retligt beteende
- ▶ P06 - Sömnrubbing
- ▶ P10 - Stamning / skenande tal / tics
- ▶ P11 - Problem med ätande hos barn
- ▶ P12 - Sängvätning / enures
- ▶ P13 - Enkopres
- ▶ P22 - Beteende symtom / besvär hos barn
- ▶ P23 - Beteende symtom / besvär hos ungdom
- ▶ P24 - Specifikt inlärningsproblem
- ▶ P75 - Somatiseringssyndrom
- ▶ P76 - Depressiv sjukdom
- ▶ P77 - Självmord / självmordsförsök
- ▶ P79 - Fobi/ obsessiv-kompulsiv störning
- ▶ P86 - Anorexia nervosa / bulimi

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: ADHD - en fungerande vardag med tidigt stöd \(God medicinsk praxisrekommendation\).\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Autismspektrumtillstånd \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Barnsängspsykos \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Beteendestörning hos barn och unga \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Depression och affektiv störning hos barn och unga \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Sexuellt utnyttjande av barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Trotssyndrom hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Rastlöst barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Specifik rädsla \(fobi\).\(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Sömnstörningar hos barn \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Näsblödning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har blödningen börjat?
- ▶ Har patienten primärsjukdomar eller medicinering?
- ▶ Fortsätter blödningen?
- ▶ Har patienten andra symtom?

Se också

- ▶ Huvudtrauma

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Blödningen stäms inte

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Under en kort period återkommande näsblödning utan andra symtom

Tidsbokning utan brådskas (4-7 dygn)

- ▶ Sällan återkommande näsblödning utan andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Näsblödning som gått om utan andra symtom: uppföljning
- ▶ Anvisningar för att stämma näsblödningen

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A10 - Blödning, Hemorragi UNS
- ▶ B82 - Anemi, annan / ospecificerad
- ▶ B83 - Purpura / koagulationsdefekt / avvikande trombocyter
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ R06 - Näsblod / epistaxis
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R88 - Annan skada på andningsorgan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Näsblödning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har blödningen börjat?
- ▶ Har patienten primärsjukdomar eller medicinering?
- ▶ Fortsätter blödningen?
- ▶ Har patienten andra symtom?

Se också

- ▶ Huvudtrauma

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Blödningen stäms inte

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Under en kort period återkommande näsblödning utan andra symtom

Tidsbokning utan brådskan (4-7 dygn)

- ▶ Sällan återkommande näsblödning utan andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Näsblödning som gått om utan andra symtom: uppföljning
- ▶ Anvisningar för att stämma näsblödningen

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A10 - Blödning, Hemorragi UNS
- ▶ B82 - Anemi, annan / ospecificerad
- ▶ B83 - Purpura / koagulationsdefekt / avvikande trombocyter
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ R06 - Näsblod / epistaxis
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R88 - Annan skada på andningsorgan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Näsblödning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ När har blödningen börjat?
- ▶ Har patienten primärsjukdomar eller medicinering?
- ▶ Fortsätter blödningen?
- ▶ Har patienten andra symtom?

Se också

- ▶ Huvudtrauma

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Blödningen stäms inte

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Under en kort period återkommande näsblödning utan andra symtom

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Sällan återkommande näsblödning utan andra symtom

Rådgivning / hemvård

- ▶ Näsblödning som gått om utan andra symtom: uppföljning
- ▶ Anvisningar för att stämma näsblödningen

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A10 - Blödning, Hemorragi UNS
- ▶ B82 - Anemi, annan / ospecificerad
- ▶ B83 - Purpura / koagulationsdefekt / avvikande trombocyter
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ R06 - Näsblod / epistaxis
- ▶ R74 - Övre luftvägsinfektion, akut
- ▶ R87 - Främmande kropp i näsa/struphuvud/luftrör
- ▶ R88 - Annan skada på andningsorgan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Krampar patienten fortfarande?
- ▶ Får man kontakt?
- ▶ Har patienten haft krampsymtom tidigare?
- ▶ Har patienten fått anfallsmedicin?
- ▶ Har patienten feber nu eller haft tidigare?
- ▶ Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?
- ▶ Allmäntillståndet?
- ▶ Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma

Nödsituation - 112

- ▶ Pågående anfall
- ▶ Nedsatt medvetandegrad efter anfall
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ första anfallet eller misstanke om anfall
- ▶ nedsatt medvetandegrad efter anfall
- ▶ återkommande anfall
- ▶ första krampen i samband med feber
- ▶ atypisk eller långvarig feberkramp
- ▶ förändring i medvetandegraden, misstänkt anfallssymtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anfall som passar känd epilepsi: vid behov anfallsmedicin och försäkra sig om att patienten har tagit epilepsimedicin
- ▶ Konstaterad epilepsi, återkommande anfall: vid behov anfallsmedicin och kontakt till egen vårdenhet följande vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ N07 - Kramper / krampanfall
- ▶ N17 - Svindel / yrsel
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ N88 - Epilepsi

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Hjärninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Epilepsi och feberkramper hos barn \(God medicinsk praxis\) \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Epilepsi hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Feberkramp \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Ryckningar hos en nyfödd \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Nattnöjesanfall \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Krampar patienten fortfarande?
- ▶ Får man kontakt?
- ▶ Har patienten haft krampsymtom tidigare?
- ▶ Har patienten fått anfallsmedicin?
- ▶ Har patienten feber nu eller haft tidigare?
- ▶ Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?
- ▶ Allmäntillståndet?
- ▶ Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma

Nödsituation - 112

- ▶ Pågående anfall
- ▶ Nedsatt medvetandegrad efter anfall
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ första anfallet eller misstanke om anfall
- ▶ nedsatt medvetandegrad efter anfall
- ▶ återkommande anfall
- ▶ första krampen i samband med feber
- ▶ atypisk eller långvarig feberkramp
- ▶ förändring i medvetandegraden, misstänkt anfallssymtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anfall som passar känd epilepsi: vid behov anfallsmedicin och försäkra sig om att patienten har tagit epilepsimedicin
- ▶ Konstaterad epilepsi, återkommande anfall: vid behov anfallsmedicin och kontakt till egen vårdenhet följande vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ N07 - Kramper / krampanfall
- ▶ N17 - Svindel / yrsel
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ N88 - Epilepsi

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Hjärninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Epilepsi och feberkramper hos barn \(God medicinsk praxis\) \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Epilepsi hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Feberkramp \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Ryckningar hos en nyfödd \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Nattskräcksanfall \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Kramp, anfall, frånvaro, svimning

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Krampar patienten fortfarande?
- ▶ Får man kontakt?
- ▶ Har patienten haft krampsymtom tidigare?
- ▶ Har patienten fått anfallsmedicin?
- ▶ Har patienten feber nu eller haft tidigare?
- ▶ Föregående händelser (eventuell olyckshändelse)?
- ▶ Allmäntillståndet?
- ▶ Anfallets varaktighet och beskrivning (hur såg det ut)?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma

Nödsituation - 112

- ▶ Pågående anfall
- ▶ Nedsatt medvetandegrad efter anfall
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ första anfallet eller misstanke om anfall
- ▶ nedsatt medvetandegrad efter anfall
- ▶ återkommande anfall
- ▶ första krampen i samband med feber
- ▶ atypisk eller långvarig feberkramp
- ▶ förändring i medvetandegraden, misstänkt anfallssymtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Anfall som passar känd epilepsi: vid behov anfallsmedicin och försäkra sig om att patienten har tagit epilepsimedicin
- ▶ Konstaterad epilepsi, återkommande anfall: vid behov anfallsmedicin och kontakt till egen vårdenhet följande vardag

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A03 - Feber
- ▶ N07 - Kramper / krampanfall
- ▶ N17 - Svindel / yrsel
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan
- ▶ N88 - Epilepsi

Ytterligare information

- ▶ [Terveyskirjasto: Hjärninflammation hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Epilepsi och feberkramper hos barn \(God medicinsk praxis\) \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Epilepsi hos barn \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Feberkramp \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Ryckningar hos en nyfödd \(FI\)](#)
- ▶ [Terveyskirjasto: Nattnöjesanfall \(FI\)](#)

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Insektsstick, djurbett

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Hurdana symtom?
- ▶ När har symtomen börjat?
- ▶ Var har patienten symtom?
- ▶ Vad har bitit, stuckit?
- ▶ Vid rabiesmisstanke konsulteras läkare (bett utomlands/på östgränsen, djur med avvikande beteende, fladdermus)

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Förgiftning
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Skador i extremitet
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Anafylaktiska symtom
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Andnöd
- ▶ Svullnad i luftvägarna
- ▶ Ormbett

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ bi-/getingstick i huvudet och halsregionen
- ▶ avancerande lokala eller allmänna symtom
- ▶ djurbett

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ avlägsning av fästing

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ djurbett (små, ej ansiktet, ej händerna/armarna)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Insektstick: lokal behandling med mild kortison
- ▶ Färskt fästingbett och inte erythema migrans-symtom (under 5 cm): uppföljning
- ▶ Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin (allergimedisin) och recept
- ▶ Vid djurbett omedelbar sköljning med rikligt med vatten.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S12 - Insektbett/-stick
- ▶ S13 - Bett av djur/mänska

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Insektstick, djurbett

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Hurdana symtom?
- ▶ När har symtomen börjat?
- ▶ Var har patienten symtom?
- ▶ Vad har bitit, stuckit?
- ▶ Vid rabiesmisstanke konsulteras läkare (bett utomlands/på östgränsen, djur med avvikande beteende, fladdermus)

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Förgiftning
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Skador i extremitet
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Anafylaktiska symtom
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Andnöd
- ▶ Svullnad i luftvägarna
- ▶ Ormbett

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ bi-/getingstick i huvudet och halsregionen
- ▶ avancerande lokala eller allmänna symtom
- ▶ djurbett

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ avlägsning av fästing

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ djurbett (små, ej ansiktet, ej händerna/armarna)

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Insektstick: lokal behandling med mild kortison
- ▶ Färskt fästingbett och inte erythema migrans-symtom (under 5 cm): uppföljning
- ▶ Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin (allergimedisin) och recept
- ▶ Vid djurbett omedelbar sköljning med rikligt med vatten.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S12 - Insektbett/-stick
- ▶ S13 - Bett av djur/mänska

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Insektstick, djurbett

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Hurdana symtom?
- ▶ När har symtomen börjat?
- ▶ Var har patienten symtom?
- ▶ Vad har bitit, stuckit?
- ▶ Vid rabiesmisstanke konsulteras läkare (bett utomlands/på östgränsen, djur med avvikande beteende, fladdermus)

Se också

- ▶ Allergisk reaktion, anafylaktiska symtom
- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Förgiftning
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Skador i extremitet
- ▶ Sår

Nödsituation - 112

- ▶ Anafylaktiska symtom
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Andnöd
- ▶ Svullnad i luftvägarna
- ▶ Ormbett

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ bi-/getingstick i huvudet och halsregionen
- ▶ avancerande lokala eller allmänna symtom
- ▶ djurbett
- ▶ djurbett (små, ej ansiktet, ej händerna/armarna)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ avlägsning av fästing

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Insektsstick: lokal behandling med mild kortison
- ▶ Färskt fästingbett och inte erythema migrans-symtom (under 5 cm): uppföljning
- ▶ Bra allmäntillstånd och nässelutslag (urtikaria): vid behov läkarordination på antihistamin (allergimedisin) och recept
- ▶ Vid djurbett omedelbar sköljning med rikligt med vatten.

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S12 - Insektbett/-stick
- ▶ S13 - Bett av djur/mänska

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Yrsel, balanssvårighet

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Trauma i bakgrunden? Se huvudtrauma.
- ▶ Har patienten infektionssymtom?
- ▶ Har det börjat plötsligt eller pågått länge?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Hög feber

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ börjat akut
- ▶ långvarigt och kräkning/huvudvärk som nytt symtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ långvarigt

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Långvarigt symtom som avancerar: till jouren redan tidigare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A06 - Svimning
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N17 - Svindel / yrsel
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Yrsel, balanssvårighet

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Trauma i bakgrunden? Se huvudtrauma.
- ▶ Har patienten infektionssymtom?
- ▶ Har det börjat plötsligt eller pågått länge?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Hög feber

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ börjat akut
- ▶ långvarigt och kräkning/huvudvärk som nytt symtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ långvarigt

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Långvarigt symtom som avancerar: till jouren redan tidigare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A06 - Svimning
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N17 - Svindel / yrsel
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Yrsel, balanssvårighet

Publicerad: 18.12.2023

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Trauma i bakgrunden? Se huvudtrauma.
- ▶ Har patienten infektionssymtom?
- ▶ Har det börjat plötsligt eller pågått länge?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Huvudtrauma
- ▶ Huvudvärk
- ▶ Kräkning
- ▶ Öronsymtom

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Hög feber

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ börjat akut
- ▶ långvarigt och kräkning/huvudvärk som nytt symtom

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ långvarigt

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Långvarigt symtom som avancerar: till jouren redan tidigare

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A06 - Svimning
- ▶ A07 - Medvetslöshet
- ▶ N01 - Huvudvärk
- ▶ N17 - Svindel / yrsel
- ▶ N71 - Meningit / encefalit
- ▶ N79 - Hjärnskakning
- ▶ N80 - Huvudskada, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Hudfärg

Publicerad: 18.12.2023

Version: 2

Grunder

Klargöra

- ▶ Är huden gul, blå, blek, röd, brokig?
- ▶ Är symtomet nytt eller långvarigt?

Se också

Inga symptomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Cyanos som börjat akut

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Färgförändringar på huden och nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Ikterus som nytt symptom och allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Blekhet som nytt symtom och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådskande (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Långvarigt symtom utreds i första hand icke brådskande

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S07 - Utslag, generaliserat
- ▶ S08 - Förändring av hudfärgen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Hudfärg

Publicerad: 18.12.2023

Version: 2

Grunder

Klargöra

- ▶ Är huden gul, blå, blek, röd, brokig?
- ▶ Är symtomet nytt eller långvarigt?

Se också

Inga symptomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Cyanos som börjat akut

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Färgförändringar på huden och nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Ikterus som nytt symptom och allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Blekhet som nytt symtom och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådskande (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Långvarigt symtom utreds i första hand icke brådskande

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S07 - Utslag, generaliserat
- ▶ S08 - Förändring av hudfärgen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Hudfärg

Publicerad: 18.12.2023

Version: 2

Grunder

Klargöra

- ▶ Är huden gul, blå, blek, röd, brokig?
- ▶ Är symtomet nytt eller långvarigt?

Se också

Inga symptomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Cyanos som börjat akut

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Färgförändringar på huden och nedsatt allmäntillstånd

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Ikterus som nytt symptom och allmäntillståndet bra

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Blekhet som nytt symtom och allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådskande (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Långvarigt symtom utreds i första hand icke brådskande

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ S07 - Utslag, generaliserat
- ▶ S08 - Förändring av hudfärgen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Smärta eller symtom i könsorganen

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ När har smärtan börjat?
- ▶ Färgförändring eller svullnad?
- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Har patienten en skada?
- ▶ Tidigare operationer?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Sår
- ▶ Urineringsproblem

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Outhärdlig smärta

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Akut testikelsmärta, svullnad
- ▶ Misstanke om bräck/svullnad i ljumskregionen, smärtsam
- ▶ Förhuden förblivit tillbakadragen, svullen, smärtsam
- ▶ Urinretention
- ▶ Blödande sår i könsorganregionen

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Svullnad i penishuvudet, smärta, varutsöndring, vresighet
- ▶ Sår/blåmärke/svullnad i könsorganregionen, inget tydligt trauma

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Varig flytning från slidan
- ▶ Klåda i underlivet
- ▶ Ny svullnad i ljumskregionen, smärtfri

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen
- ▶ Vid urinretention hos ett litet barn ges anvisning om varmt bad
- ▶ Varutsöndring (obs. badanvisning)
- ▶ Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär, tas upp vid ålderskontroll i skolhälsovården

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ Y01 - Smärta i penis
- ▶ Y02 - Smärta i testis/scrotum
- ▶ Y03 - Flytning från penis/urinrör
- ▶ Y04 - Penis annat symtom/besvär
- ▶ Y05 - Scrotum/ testikel symtom/ besvär
- ▶ Y72 - Genital herpes hos man
- ▶ Y74 - Orkit/epididymit
- ▶ Y75 - Balanit
- ▶ Y80 - Skada på manliga könsorgan
- ▶ Y81 - Förhudsförträngning/ överlödlig förhud
- ▶ Y83 - Retinerad testikel/kryptorkism
- ▶ Y86 - Hydrocele

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Smärta eller symtom i könsorganen

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ När har smärtan börjat?
- ▶ Färgförändring eller svullnad?
- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Har patienten en skada?
- ▶ Tidigare operationer?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Sår
- ▶ Urineringsproblem

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Outhärdlig smärta

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Akut testikelsmärta, svullnad
- ▶ Misstanke om bräck/svullnad i ljumskregionen, smärtsam
- ▶ Förhuden förblivit tillbakadragen, svullen, smärtsam
- ▶ Urinretention
- ▶ Blödande sår i könsorganregionen

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Svullnad i penishuvudet, smärta, varutsöndring, vresighet
- ▶ Sår/blåmärke/svullnad i könsorganregionen, inget tydligt trauma

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Varig flytning från slidan
- ▶ Klåda i underlivet
- ▶ Ny svullnad i ljumskregionen, smärtfri

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen
- ▶ Anvisningar om varmt bad vid urinretention
- ▶ Varutsöndring (obs. badanvisning)
- ▶ Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär, tas upp vid ålderskontrollen på rådgivningen

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ Y01 - Smärta i penis
- ▶ Y02 - Smärta i testis/scrotum
- ▶ Y03 - Flytning från penis/urinrör
- ▶ Y04 - Penis annat symtom/besvär
- ▶ Y05 - Scrotum/ testikel symtom/ besvär
- ▶ Y72 - Genital herpes hos man
- ▶ Y74 - Orkit/epididymit
- ▶ Y75 - Balanit
- ▶ Y80 - Skada på manliga könsorgan
- ▶ Y81 - Förhudsförträngning/ överlödlig förhud
- ▶ Y83 - Retinerad testikel/kryptorkism
- ▶ Y86 - Hydrocele

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Smärta eller symtom i könsorganen

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtligt, irriterat, slapt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ När har smärtan börjat?
- ▶ Färgförändring eller svullnad?
- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Har patienten en skada?
- ▶ Tidigare operationer?

Se också

- ▶ Feber
- ▶ Hudfärg
- ▶ Hudsymtom
- ▶ Sår
- ▶ Urineringsproblem

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Outhärdlig smärta

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Svullnad i penishuvudet, smärta, varutsöndring, vresighet
- ▶ Ny svullnad i ljumskregionen, smärtfri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Varig flytning från slidan
- ▶ Klåda i underlivet

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen
- ▶ Anvisningar om varmt bad vid urinretention
- ▶ Varutsöndring (obs. badanvisning)
- ▶ Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär, tas upp vid ålderskontrollen på rådgivningen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen
- ▶ Vid urinretention hos ett litet barn ges anvisning om varmt bad
- ▶ Varutsöndring (obs. badanvisning)
- ▶ Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ Y01 - Smärta i penis
- ▶ Y02 - Smärta i testis/scrotum
- ▶ Y03 - Flytning från penis/urinrör
- ▶ Y04 - Penis annat symtom/besvär
- ▶ Y05 - Scrotum/ testikel symtom/ besvär
- ▶ Y72 - Genital herpes hos man
- ▶ Y74 - Orkit/epididymit
- ▶ Y75 - Balanit
- ▶ Y80 - Skada på manliga könsorgan
- ▶ Y81 - Förhudsförträngning/ överlödlig förhud
- ▶ Y83 - Retinerad testikel/kryptorkism
- ▶ Y86 - Hydrocele

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Smärta eller symtom i könsorganen

Publicerad: 19.12.2023

Version: 4

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ När har smärtan börjat?
- ▶ Färgförändring eller svullnad?
- ▶ Har patienten andra symtom?
- ▶ Har patienten en skada?
- ▶ Tidigare operationer?

Se också

- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka
- ▶ Outhärdlig smärta

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Svullnad i penishuvudet, smärta, varutsöndring, vresighet
- ▶ Ny svullnad i ljumskregionen, smärtfri

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Varig flytning från slidan
- ▶ Klåda i underlivet

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Smärtmedicin före patienten kommer till mottagningen
- ▶ Anvisningar om varmt bad vid urinretention
- ▶ Varutsöndring (obs. badanvisning)
- ▶ Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär, tas upp vid ålderskontrollen på rådgivningen

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

- ▶ Varutsöndring (obs. badanvisning)
- ▶ Trång förhud utan smärtsymtom och urineringsbesvär

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ Y01 - Smärta i penis
- ▶ Y02 - Smärta i testis/scrotum
- ▶ Y03 - Flytning från penis/urinrör
- ▶ Y04 - Penis annat symtom/besvär
- ▶ Y05 - Scrotum/ testikel symtom/ besvär
- ▶ Y72 - Genital herpes hos man
- ▶ Y74 - Orkit/epididymit
- ▶ Y75 - Balanit
- ▶ Y80 - Skada på manliga könsorgan
- ▶ Y81 - Förhudsförträngning/ överlödlig förhud
- ▶ Y83 - Retinerad testikel/kryptorkism
- ▶ Y86 - Hydrocele

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Krockpatient eller patient som fallit

Publicerad: 27.01.2022

Version: 1

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och när?
- ▶ Varifrån och hur har patienten fallit? Antal meter (fallhöjd)
- ▶ Hurdan krock är det fråga om? Fart, färdmedel (bil, moped, cykel), har skyddsutrustningen utlösts? Användes säkerhetsbälte/bilbarnstol/-sits/babyskydd?
- ▶ Medvetlöshet, minnesförlust?
- ▶ Är patienten nu välmående, vad gör hen?
- ▶ Primärsjukdomar?
- ▶ Fallit, slagit huvudet se huvudtrauma
- ▶ Medicinering?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

- ▶ Störning i medvetandegraden
- ▶ Frakturer med felställningar
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Krock som skett alldeles nyss
- ▶ Fallit över 3 meter

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ vilket som helst symtom eller fynd, fordonets hastighet har varit minst 50 km/h i krocken eller vid plötsligt stopp, även om patienten är symtomfri
- ▶ fallit, har symtom
- ▶ fallit från minst 3 meter

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ tidigare (< 1 vecka) krock, varefter lindrig icke undersökt och diagnosticerad smärta i nacken/axlarna
- ▶ undersökt krockpatient, lindrig skada (kräver inte vård), besväret fortsätter

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering
- ▶ Slagit huvudet (se anvisningen huvudtrauma)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A80 - Skada, ospecificerad
- ▶ A81 - Skador, multipla

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Krockpatient eller patient som fallit

Publicerad: 27.01.2022

Version: 1

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och när?
- ▶ Varifrån och hur har patienten fallit? Antal meter (fallhöjd)
- ▶ Hurdan krock är det fråga om? Fart, färdmedel (bil, moped, cykel), har skyddsutrustningen utlösts? Användes säkerhetsbälte/bilbarnstol/-sits/babyskydd?
- ▶ Medvetlöshet, minnesförlust?
- ▶ Är patienten nu välmående, vad gör hen?
- ▶ Primärsjukdomar?
- ▶ Fallit, slagit huvudet se huvudtrauma
- ▶ Medicinering?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

- ▶ Störning i medvetandegraden
- ▶ Frakturer med felställningar
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Krock som skett alldeles nyss
- ▶ Fallit över 3 meter

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ vilket som helst symtom eller fynd, fordonets hastighet har varit minst 50 km/h i krocken eller vid plötsligt stopp, även om patienten är symtomfri
- ▶ fallit, har symtom
- ▶ fallit från minst 3 meter

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ tidigare (< 1 vecka) krock, varefter lindrig icke undersökt och diagnosticerad smärta i nacken/axlarna
- ▶ undersökt krockpatient, lindrig skada (kräver inte vård), besväret fortsätter

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering
- ▶ Slagit huvudet (se anvisningen huvudtrauma)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A80 - Skada, ospecificerad
- ▶ A81 - Skador, multipla

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Krockpatient eller patient som fallit

Publicerad: 27.01.2022

Version: 1

Grunder

Klargöra

- ▶ Vad har hänt och när?
- ▶ Varifrån och hur har patienten fallit? Antal meter (fallhöjd)
- ▶ Hurdan krock är det fråga om? Fart, färdmedel (bil, moped, cykel), har skyddsutrustningen utlösts? Användes säkerhetsbälte/bilbarnstol/-sits/babyskydd?
- ▶ Medvetlöshet, minnesförlust?
- ▶ Är patienten nu välmående, vad gör hen?
- ▶ Primärsjukdomar?
- ▶ Fallit, slagit huvudet se huvudtrauma
- ▶ Medicinering?

Se också

Inga symtomkort

Nödsituation – 112

- ▶ Störning i medvetandegraden
- ▶ Frakturer med felställningar
- ▶ Nedsatt allmäntillstånd
- ▶ Krock som skett alldeles nyss
- ▶ Fallit över 3 meter

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ vilket som helst symtom eller fynd, fordonets hastighet har varit minst 50 km/h i krocken eller vid plötsligt stopp, även om patienten är symtomfri
- ▶ fallit, har symtom
- ▶ fallit från minst 1 meter

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ tidigare (< 1 vecka) krock, varefter lindrig icke undersökt och diagnosticerad smärta i nacken/axlarna
- ▶ undersökt krockpatient, lindrig skada (kräver inte vård), besväret fortsätter

Rådgivning / hemvård

- ▶ Smärtmedicinering
- ▶ Slagit huvudet (se anvisningen huvudtrauma)

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A80 - Skada, ospecificerad
- ▶ A81 - Skador, multipla

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - coronavirussmitta

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Coronavirusinfektion som konstaterats med test? Eller misstanke om sjukdom?
- ▶ Benägenhet för trombos?

Primärsjukdomar, riskfaktorer för allvarlig sjukdom?
- ▶ <https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom>
- ▶ Symtomen på coronavirusinfektion hos barn är desamma som vid vilken infektion som helst, se symtomenliga korten (t.ex. feber, andnöd).

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Om trombosbenägenhet (konsultera före sändning)
- ▶ Om patienten har en primärsjukdom/riskfaktor

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Tidigare kända underliggande sjukdomar som blivit värre, allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvariga men störande symtom, allmäntillståndet är bra
- ▶ Utdragna symtom och tidvis andnöd i samband med hårdare ansträngning
- ▶ Långvariga eftersymtom, såsom trötthet, luftvägssymtom, huvudvärk, hjärtsymtom och ledsmärta (inte nytt symtom)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Coronapositiv och barnet symtomfritt uppföljning hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R83 - Infektion i andningsorganen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - coronavirussmitta

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Coronavirusinfektion som konstaterats med test? Eller misstanke om sjukdom?
- ▶ Benägenhet för trombos?

Primärsjukdomar, riskfaktorer för allvarlig sjukdom?
- ▶ <https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirusjukdom>
- ▶ Symtomen på coronavirusinfektion hos barn är desamma som vid vilken infektion som helst, se symtomenliga korten (t.ex. feber, andnöd).

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Reagoimaton, ei saa kontaktia, vaikeasti heräteltävissä, sekavuus
- ▶ Ei kykene liikkumaan edes tarvittaessa

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Om trombosbenägenhet (konsultera före sändning)
- ▶ Om patienten har en primärsjukdom/riskfaktor

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Tidigare kända underliggande sjukdomar som blivit värre, allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvariga men störande symtom, allmäntillståndet är bra
- ▶ Utdragna symtom och tidvis andnöd i samband med hårdare ansträngning
- ▶ Långvariga eftersymtom, såsom trötthet, luftvägssymtom, huvudvärk, hjärtsymtom och ledsmärta (inte nytt symtom)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Coronapositiv och barnet symtomfritt uppföljning hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R83 - Infektion i andningsorganen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - coronavirussmitta

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
 - ▶ Kan barnet väckas?
 - ▶ Slumrar barnet till?
 - ▶ Får man kontakt med barnet?
 - ▶ Coronavirusinfektion som konstaterats med test? Eller misstanke om sjukdom?
 - ▶ Benägenhet för trombos?
- Primärsjukdomar, riskfaktorer för allvarlig sjukdom?
- ▶ <https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom>
 - ▶ Symtomen på coronavirusinfektion hos barn är desamma som vid vilken infektion som helst, se symtomenliga korten (t.ex. feber, andnöd).

Se också

- ▶ Andnöd, andningssvårighet
- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slapt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Om trombosbenägenhet (konsultera före sändning)
- ▶ Om patienten har en primärsjukdom/riskfaktor

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Tidigare kända underliggande sjukdomar som blivit värre, allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvariga men störande symtom, allmäntillståndet är bra
- ▶ Utdragna symtom och tidvis andnöd i samband med hårdare ansträngning
- ▶ Långvariga eftersymtom, såsom trötthet, luftvägssymtom, huvudvärk, hjärtsymtom och ledsmärta (inte nytt symtom)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Coronapositiv och barnet symtomfritt uppföljning hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R83 - Infektion i andningsorganen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - coronavirussmitta

Publicerad: 18.12.2023

Version: 5

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt?
 - ▶ Kan barnet väckas? - Slumrar barnet till?
 - ▶ Får man kontakt med barnet?
 - ▶ Coronavirusinfektion som konstaterats med test? Eller misstanke om sjukdom?
 - ▶ Benägenhet för trombos?
- Primärsjukdomar, riskfaktorer för allvarlig sjukdom?
- ▶ <https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom>
 - ▶ Symtomen på coronavirusinfektion hos barn är desamma som vid vilken infektion som helst, se symtomenliga korten (t.ex. feber, andnöd).

Se också

- ▶ Feber

Nödsituation - 112

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Om trombosbenägenhet
- ▶ Om patienten har en primärsjukdom/riskfaktor
- ▶ Feber, andningssvårighet, orkar inte suga/äta från flaska eller avvikande gråtmild och coronatestet positivt eller coronavirusinfektion i familjen

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet

Mottagning 1-3 dygn

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Tidigare kända underliggande sjukdomar som blivit värre, allmäntillståndet bra

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

- ▶ Långvariga men störande symtom, allmäntillståndet är bra
- ▶ Utdragna symtom och tidvis andnöd i samband med hårdare ansträngning
- ▶ Långvariga eftersymtom, såsom trötthet, luftvägssymtom, huvudvärk, hjärtsymtom och ledsmärta (inte nytt symtom)

Rådgivning / hemvård

- ▶ Enligt kortet för det aktuella symtomet
- ▶ Coronapositiv och barnet symtomfritt uppföljning hemma

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ R83 - Infektion i andningsorganen, annan

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

7 - 15 år - Misstanke om diabetes

Publicerad: 12.01.2024

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Dricker patienten mycket?
- ▶ Går patienten ofta på toaletten?
- ▶ Har sängvätningen börjat igen?
- ▶ Kräks patienten?
- ▶ Finns det något avvikande i andningen?
- ▶ Har blodsockret mätts? Värde?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation

Nödsituation - 112

- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov
- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Avvikande andning
- ▶ Misstanke om färsk diabetes och kräkningar

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Ökad törst och urinering
- ▶ Blodsockret har mätts, värde över 11 (2h sedan måltid)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Blodsockret har mätts, värde 7-11 (2h sedan måltid)

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ T01 - Överdriven törst
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

1 - 6 år - Misstanke om diabetes

Publicerad: 12.01.2024

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Kan barnet väckas?
- ▶ Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Smärta?
- ▶ Orkar barnet röra på sig?
- ▶ Är barnet exceptionellt trött?
- ▶ Dricker patienten mycket?
- ▶ Går patienten ofta på toaletten? Är blöjan våt ofta?
- ▶ Har sängvätningen börjat igen?
- ▶ Kräks patienten?
- ▶ Finns det något avvikande i andningen?
- ▶ Har blodsockret mätts? Värde?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation

Nödsituation - 112

- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Avvikande andning
- ▶ Misstanke om färsk diabetes och kräkningar
- ▶ Slappt, blekt, sjukt barn
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat
- ▶ Kan inte röra sig ens vid behov

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Ökad törst och urinering
- ▶ Blodsockret har mätts, värde över 11 (2h sedan måltid)

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

- ▶ Blodsockret har mätts, värde 7-11 (2h sedan måltid)

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ T01 - Överdriven törst
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

3 - 12 mån - Misstanke om diabetes

Publicerad: 12.01.2024

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling, gråtmilt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Dricker patienten mycket?
- ▶ Är blöjan våt ofta?
- ▶ Kräks patienten?
- ▶ Finns det något avvikande i andningen?
- ▶ Har blodsockret mätts? Värde?

Se också

- ▶ Avvikande blodsockervariation

Nödsituation - 112

- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Avvikande andning
- ▶ Misstanke om färsk diabetes och kräkningar
- ▶ Slappt, blekt, sjukt barn
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtmilt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka, barnet är förvirrat

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Ökad törst och urinering
- ▶ Avvikande blodsocker har mätts, värde över 7

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ T01 - Överdriven törst
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll

0 - 3 mån - Misstanke om diabetes

Publicerad: 12.01.2024

Version: 3

Grunder

Klargöra

- ▶ Är barnet känsligt för behandling (skriker barnet till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt?
- ▶ Kan barnet väckas? Slumrar barnet till?
- ▶ Får man kontakt med barnet?
- ▶ Kräks patienten?
- ▶ Finns det något avvikande i andningen?

Se också

Inga symptomkort

Nödsituation - 112

- ▶ Varierande medvetandegrad
- ▶ Avvikande andning
- ▶ Misstanke om färsk diabetes och kräkningar
- ▶ Slappt, blekt, sjukt barn
- ▶ Barnet känsligt för behandling (barnet skriker till vid behandling), gråtligt, irriterat, slappt, blekt
- ▶ Reagerar inte, får ingen kontakt, svårt att väcka

Hänvisas till vård 24/7

- ▶ Misstanke om diabetes

Hänvisas till behandling inom 24 timmar, förutom nattetid (21-08)

Inga grunder

Mottagning 1-3 dygn

Inga grunder

Tidsbokning utan brådska (4-7 dygn)

Inga grunder

Rådgivning / hemvård

Inga grunder

Mer information

Möjliga ICPC2-koder

- ▶ A04 - Svaghet / trötthet, allmän
- ▶ D10 - Uppkastning
- ▶ T01 - Överdriven törst
- ▶ T08 - Viktförlust
- ▶ T89 - Diabetes, typ 1
- ▶ U02 - Täta urinträngningar/pollakisuri

Ytterligare information

Inget innehåll

Instruktioner om egenvård

Inget innehåll